



人類乳頭狀瘤病毒(HPV) 感染

Human Papillomavirus (HPV) Infection

甚麼是 HPV 感染？

HPV 是最常見的性傳播感染病之一。這類病毒有 100 多種，其中兩種導致女性 70% 的子宮頸癌，另有兩種則造成男女兩性 90% 的生殖器官疣。

HPV 如何傳播？

人們進行口交、陰道或肛門接觸的性活動時，HPV 會經由皮膚接觸，由受感染者傳給他人。HPV 不一定透過性交傳染。

HPV 可感染整個生殖器官及周遭的皮膚，包括陰道、子宮頸、直腸、陰莖、陰門和肛門。同一時間感染超過一種 HPV 的情況，也有可能發生。

HPV 有甚麼徵狀？

感染 HPV 的人，大多沒有任何徵狀，甚至將該病毒傳染別人仍不自知。

感染 HPV 的情況有多普遍？

每 4 個性活躍的女性當中，有 3 個會在其一生中，最少受到 1 次 HPV 感染。性伴侶愈多，感染和傳播 HPV 的機會愈大。

感染 HPV 會有甚麼危險？

大多數子宮頸受 HPV 感染的女性，其感染會在兩年內消退。然而，感染若持續不退，受感染的子宮頸細胞可能會在 1 至 20 年內變為癌細胞。

在卑詩省，每年會有：

- 150 名女性患上子宮頸癌。
- 40 名女性死於子宮頸癌。
- 6000 名女性出現子宮頸癌變前期的高危變化。
- 10,000 個穿刺手術進行，以防子宮頸癌病變。

HPV 如何治療？

HPV 感染並無療法，但接種 HPV 疫苗，卻可以預防某些 HPV。女孩和女性在性活躍前接種該疫苗，可以得到最大的保障。

我們建議，年齡介乎 9 歲至 26 歲的女童和女性，適宜在還未接觸 HPV 之前，接受 HPV 疫苗注射。HPV 疫苗可預防 HPV 感染，但若感染後才進行注射，便不能消除該病毒。

由於HPV疫苗無法預防所有種類的子宮頸癌，性活躍的女性定期接受柏氏子宮頸抹片檢查，仍然十分重要。

誰應接種 HPV 疫苗？

由 2008-2009 學年度開始，衛生當局會為卑詩省內 6 年級和 9 年級女生，免費進行 HPV 疫苗注射。

未受 HPV 感染的性活躍女性，接種 HPV 疫苗亦有作用。

未能透過 HPV 疫苗校內接種計劃接受注射的女性，請與家庭醫生討論如何接種該疫苗。

怎樣降低感染 HPV 的風險？

- 接種 HPV 疫苗。
- 進行性活動時，經常使用安全套。
- 避免過早開始進行性活動。

若需進一步資料

如欲得到更多資料，請瀏覽下列 HealthLink BC Files (卑詩健康結連檔案)：

[#101b 人類乳頭狀瘤病毒\(HPV\)疫苗](#)

[6 年級及 9 年級女學童接種計劃](#)

[#08k Genital Warts](#)

[#08C Pelvic Inflammatory Disease \(PID\)](#)

如欲了解較多 HealthLink BC File 課題，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm 網頁，或到訪您區內的公共衛生單位。

如要獲取卑詩省的非緊急健康資訊和服務，可點擊 www.HealthLinkBC.ca，或致電 8-1-1。

失聰或弱聽人士如需協助，在卑詩省內可致電 7-1-1。

我們可按要求，提供 130 多種語言的翻譯服務。



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY