



小兒麻痺症疫苗 (IPV) Polio Vaccine (IPV)

過去 50 年來，防疫注射在加拿大挽救的生命，多於任何其他醫療措施。

甚麼是小兒麻痺症疫苗 (IPV) ？

小兒麻痺症疫苗可以預防小兒麻痺症病毒所引起的感染。這種簡稱 IPV 的失活小兒麻痺症疫苗 (Inactivated Polio Vaccine)，獲加拿大衛生部核准。

甚麼人應該接種小兒麻痺症疫苗？

接種這類疫苗的通常是成人，他們在兒時接種過一系列的小兒麻痺症疫苗，並將要到外國工作或旅遊，而當地仍有小兒麻痺症發生，因此要接種此疫苗作為加強劑。

從未接種過小兒麻痺症疫苗的人，如在工作或旅遊時可能接觸到小兒麻痺症病毒，可以接種一系列的小兒麻痺症疫苗。

該疫苗系列中的首兩劑相隔 4 至 8 個星期注射，第三劑則在接種第二劑的 6 至 12 個月後注射。

幼童的小兒麻痺症免疫注射通常與其他疫苗一起接種，例如白喉、破傷風、百日咳、乙型肝炎及乙型流感嗜血桿菌疫苗。有關混合疫苗的詳情，請參閱以下的 HealthLink BC File (卑詩健康結連檔案)：[#105 白喉、破傷風、百日咳、乙型肝炎、小兒麻痺症及乙型流感嗜血桿菌 \(DTaP-HB-IPV-Hib\) 疫苗。](#)

已接種其他疫苗以致能預防白喉、破傷風、百日咳及乙型流感嗜血桿菌的嬰孩和兒童，也可以接種小兒麻痺症疫苗系列。

接種疫苗可能出現的反應

接種疫苗，遠比患上小兒麻痺症來得安全。

對疫苗的一般反應可以包括：發燒、注射部位出現疼痛、發腫或發紅。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 (Acetaminophen) 或 Tylenol®。水楊酸 (ASA) 或 Aspirin®，不應給任何 20 歲以下人士服用，因為有造成雷伊氏綜合症的風險。

接種任何疫苗後，必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在非常罕見的情況下，會出現稱為全身性過敏反應 (anaphylaxis) 的可致命過敏反應。病癥可能包括蕁麻疹、呼吸困難，或喉嚨、舌頭、嘴唇腫脹。萬一您在離開診所後發生這種情況，請致電 911 或當地的緊急求助電話。這種反應是可以治療的，而且在接種疫苗的人士當中，發生率低於百萬分之一。

如有任何嚴重或未可預料的反應，請告訴您的公眾健康護士或醫生。

甚麼人不可以接種小兒麻痺症疫苗?

如果您曾對以往接種的小兒麻痺症疫苗，或其中所含的任何成分如新霉素 (neomycin)、鏈黴素 (streptomycin) 或多黏菌素 B (polymyxin B)，出現危及生命的反應，請與公眾健康護士或醫生商量。

甚麼是小兒麻痺症？

小兒麻痺症是小兒麻痺病毒感染引起的疾病。有些受感染者沒有呈現症狀，有些人則手腳癱瘓，甚至死亡。

小兒麻痺症病毒含於患者的糞便中。如糞便污染到手部、食物或水，也許會感染其他人。

免疫注射已令世界許多地方不再有人患上小兒麻痺症。加拿大在 1994 年獲認證為「無小兒麻痺症」的國家。過去 30 年來，卑詩省的小兒麻痺症個案只限於未接種疫苗的居民與外國的小兒麻痺症染病者接觸而受感染。

思想成熟未成年人士自決權

我們建議家長或監護人與子女商討同意防疫注射問題。為兒童接種疫苗之前，當局會先盡量取得家長 / 監護人或代表的同意。然而，年齡未滿十九歲的兒童，如能了解每種疫苗的好處和可能反應，以及不接種疫苗的風險，便可合法同意或拒絕接種疫苗。

如欲了解較多 HealthLink BC File 課題，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm 網頁，或到訪您區內的公共衛生單位。

如要獲取卑詩省的非緊急健康資訊和服務，可點擊 www.HealthLinkBC.ca，或致電 8-1-1。

失聰或弱聽人士如需協助，在卑詩省內可致電 7-1-1。

我們可按要求，提供 130 多種語言的翻譯服務。



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY