



乙型肝炎幼兒疫苗 Hepatitis B Infant Vaccine

保護您孩子的健康。
讓他們按時接種疫苗。

若您能讓孩子按時接種所有疫苗，
他們終身就能避免許多疾病的威脅。

乙型肝炎疫苗	兒童接種疫苗的年齡
第一劑	2 個月
第二劑	4 個月
第三劑	6 個月

過去五十年來，防疫注射在加拿大挽救的生命，多於任何其他醫療措施。

甚麼是乙型肝炎疫苗？

乙型肝炎疫苗能預防乙型肝炎病毒。疫苗獲加拿大衛生部核准。

兒童可以免費接種乙型肝炎疫苗，作為例行防疫注射的一部分。請致電您區內的公眾健康護士或醫生預約。

甚麼人應該接種乙型肝炎疫苗？

這種疫苗適用於嬰孩，每組疫苗共包括三劑，分別在嬰兒 2 個月、4 個月和 6 個月大時接種。這種疫苗一般會混合其他的兒童期疫苗，包括白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺症及乙型 流感嗜血桿菌 預防疫苗。欲知詳情，請參閱 HealthLink BC File (卑詩健康結連檔案) [#105 白喉、破傷風、百日咳、乙型肝炎、小兒麻痺症及乙型流感嗜血桿菌 \(DTaP-HB-IPV-Hib\) 疫苗](#)。

某些嬰兒有較大機會感染乙型肝炎，他們應在出生後即接種一劑乙型肝炎疫苗，然後在 2 個月、4 個月和 6 個月大時另行接種三劑疫苗。如要了解哪些嬰兒有較大風險感染乙型肝炎，他們怎樣才能獲得保障等詳情，請參閱 HealthLink BC File (卑詩健康結連檔案) [#25d 幫助初生嬰兒預防乙型肝炎](#)。

您必須將所有防疫注射記錄下來。

乙型肝炎疫苗的益處

乙型肝炎疫苗是預防您的孩子染上乙型肝炎及其併發症 (包括可能導致肝癌及足以致命的永久性肝臟損害) 的最佳方法。

當您讓自己的孩子接種疫苗時，也同時保護了其他人。

接種疫苗後可能出現的反應

疫苗是很安全的。接種疫苗，遠比小孩患上乙型肝炎來得安全。

對疫苗的一般反應可以包括：注射部位出現疼痛、腫脹或發紅。疫苗接種者亦可能會輕微發燒或出現一般不適。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 (Acetaminophen) 或 Tylenol®。水楊酸(ASA) 或 Aspirin®，不應給任何二十歲以下人士服用，因為有造成雷伊氏綜合症的風險。

接種任何疫苗後，必須逗留在診所內十五分鐘，因為在非常罕見的情況下會出現稱為全身性過敏反應 (anaphylaxis) 的可致命過敏反應。病癥可能包括蕁麻疹、呼吸困難，或喉嚨、舌頭、嘴唇腫脹。萬一您在離開診所後發生這種情況，請致電 911 或當地的緊急求助電話。這種反應是可以治療的，而且在接種疫苗的人士當中，發生率低於百萬分之一。

如有任何嚴重或未可預料的反應，請告訴您的公眾健康護士或醫生。

甚麼人不可以接種乙型肝炎疫苗？

如果您的孩子對以往接種的乙型肝炎疫苗注射劑、或其中所含的任何成分如酵母或膠乳，曾引起危及生命的反應，請與公眾健康護士或醫生商量。

甚麼是乙型肝炎？

乙型肝炎是一種侵襲肝臟的病毒。病毒可能會導致嚴重疾病，包括肝臟的永久性損害（肝硬化）。乙型肝炎也是導致肝癌的主要原因。肝癌是一種足以致命的疾病。

乙型肝炎病毒透過與患者的血液或體液接觸，在人與人之間傳播。染血的物件如牙

刷、剃刀或服藥用的針筒，以及在沒有保護措施下與乙型肝炎患者性交等，亦是傳播途徑。

感染乙型肝炎病毒的母親，在生產時可將病毒傳給初生嬰兒。受乙型肝炎感染的嬰兒，往往沒有任何病癥，但多數會終生受感染。因此幼童應該從小就接種疫苗，以獲保障。

如欲了解較多 HealthLink BC File 課題，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm 網頁，或到訪您區內的公共衛生單位。

如要獲取卑詩省的非緊急健康資訊和服務，可點擊 www.HealthLinkBC.ca，或致電 8-1-1。

失聰或弱聽人士如需協助，在卑詩省內可致電 7-1-1。

我們可按要求，提供 130 多種語言的翻譯服務。



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY