



## Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) Papillomavirus (HPV) Vaccine

### Qu'est-ce que le vaccin contre le VPH?

Le vaccin contre le VPH, ou Gardasil<sup>MC</sup>, protège contre deux types de virus du papillome humain qui causent la plupart des cancers du col de l'utérus et certains autres cancers moins courants comme celui de l'anus, du pénis, du vagin ou de la vulve. Il protège aussi contre deux types de VPH qui causent des verrues génitales.

### Qui devrait se faire vacciner contre le VPH?

Le vaccin contre le VPH est administré gratuitement aux filles inscrites en 6<sup>e</sup> année en C.-B., parce que :

- Les filles sont mieux protégées quand elles reçoivent le vaccin avant de devenir sexuellement actives.
- Il prévient l'infection par le VPH, mais ne l'élimine pas lorsque l'infection se déclare.
- Les parois de l'appareil reproducteur des adolescentes sont toujours en train de se développer. Cela les rend plus susceptibles d'être infectées par le VPH.

Les filles nées en 1994 ou après qui ont manqué l'administration du vaccin contre le VPH peuvent communiquer avec leur unité de santé publique locale pour se faire vacciner gratuitement.

Le vaccin contre le VPH ou Gardasil<sup>MC</sup> est également approuvé pour les personnes suivantes, mais ne leur est pas administré gratuitement :

- les filles et les femmes de 9 à 45 ans;
- les garçons et les hommes de 9 à 26 ans.

Les personnes qui ne reçoivent pas de vaccin en vertu du programme d'immunisation dans les écoles peuvent s'adresser à leur fournisseur de soins de santé pour savoir comment se le procurer à titre privé.

Il est préférable de se faire vacciner contre le VPH avant d'avoir une vie sexuelle active et d'être exposé au VPH. Toutefois, le vaccin peut tout de même comporter des avantages pour les personnes sexuellement actives. Le vaccin ne traite pas les infections déclarées.

### Avantages du vaccin contre le VPH

Lorsqu'il est administré à des personnes n'ayant jamais été infectées par le VPH, le vaccin Gardasil<sup>MC</sup> prévient :

- 7 cas sur 10 de cancer du col de l'utérus;
- 9 cas sur 10 de verrues génitales.

Sûr et très efficace, le vaccin provoque peu d'effets secondaires.

Il est important que les femmes passent des tests de Papanicolaou (Pap) lorsqu'elles deviennent sexuellement actives, parce que le vaccin contre le VPH protège contre presque tous les cancers du col de l'utérus, mais pas tous.

### Réactions possibles après la vaccination

Les réactions courantes peuvent comprendre de la douleur, une rougeur ou une enflure au point d'injection dans le bras, des maux de tête et de la fièvre

Tout vaccin comporte la possibilité extrêmement rare d'une réaction mortelle appelé anaphylaxie. Elle peut inclure de l'urticaire, des difficultés respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue, des lèvres ou des yeux. Si cela se produit, appelez le 911 ou votre numéro d'urgence local. Cette réaction peut être traitée et survient chez moins d'une personne vaccinée sur un million.

Il est important de rester dans la clinique pendant 15 minutes après avoir reçu un vaccin

Signalez toute réaction grave ou inattendue à votre fournisseur de soins de santé.

**En cas de fièvre ou de douleurs, on peut donner de l'acétaminophène ou du Tylenol<sup>®</sup>. Il ne faut PAS donner d'AAS ou d'aspirine aux moins de 20 ans, en raison des risques de syndrome de Reye.**

## Qui ne devrait pas être vacciné?

Le vaccin n'est pas recommandé :

- aux personnes qui ont déjà eu une réaction qui aurait pu être fatale à une dose antérieure du vaccin contre le VPH ou à toute composante du vaccin (y compris les levures);
- aux femmes enceintes.

## Qu'est-ce que le VPH et qui peut le contracter?

Le VPH est l'une des infections transmissibles sexuellement (ITS) les plus fréquentes. Trois personnes sexuellement actives sur quatre contracteront le VPH à un moment de leur vie.

Toute personne ayant des relations sexuelles avec des contacts oraux ou génitaux peut être infectée. Il n'est pas nécessaire d'avoir une relation sexuelle complète pour être infecté.

## Qu'arrive-t-il si vous êtes infecté par le VPH?

- La plupart des personnes infectées ne présentent aucun signe ou symptôme et peuvent transmettre le virus sans même le savoir.
- Le plus souvent, une infection au VPH s'éliminera d'elle-même. Mais certaines personnes ne l'élimineront pas et les cellules infectées peuvent devenir cancéreuses avec le temps.

## Chaque année, en C.-B. :

- 150 femmes auront un cancer du col de l'utérus et 40 en mourront;
- 6 000 femmes développeront des changements à haut risque de précancer du col de l'utérus;
- 10 000 procédures invasives seront effectuées pour mettre fin à la croissance d'un cancer du col de l'utérus;
- 90 personnes contracteront un cancer de l'anus et 20 en mourront;
- 5 500 personnes auront des verrues génitales.

## Consentement d'une personne mineure dotée de maturité d'esprit

Il est conseillé aux parents ou aux tuteurs de discuter du consentement à la vaccination avec les enfants. Avant l'immunisation, on s'efforce d'abord d'obtenir le consentement d'un parent, d'un tuteur ou d'un représentant. Toutefois, les enfants de moins de 19 ans

capables de comprendre les avantages et les réactions possibles en relation avec chaque vaccin, ainsi que les risques de ne pas se faire vacciner, peuvent légalement consentir aux immunisations ou les refuser.

## Pour plus de renseignements

Pour plus de renseignements, voir la HealthLink BC File (fiche santé de la C.-B.) [no 101a L'infection au virus du papillome humain \(VPH\)](#).

Pour plus de renseignements sur les immunisations, visitez Immunize BC, à [www.immunizebc.ca](http://www.immunizebc.ca)

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLink BC File, visitez [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm) ou votre unité de santé publique locale.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et des services de santé non urgents, cliquez sur [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) ou composez le **8-1-1** en C.-B.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1 en C.-B.

Des services de traduction dans plus de 130 langues sont disponibles sur demande.



BRITISH  
COLUMBIA

ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control  
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY