



Le vaccin conjugué contre le pneumocoque (VCP-13) Pneumococcal Conjugate (PCV 13) Vaccine

**Assurez la sécurité de vos enfants.
Faites-les vacciner à temps.**

S'il est vacciné à temps, votre enfant sera protégé pour la vie contre de nombreuses maladies.

Au cours des 50 dernières années, la vaccination a sauvé plus de vies au Canada que toute autre mesure touchant la santé.

Qu'est-ce que le vaccin VCP-13?

Le vaccin VCP-13 remplace le vaccin VCP-7 qui était utilisé en C.-B. depuis 2003. Il protège contre 13 types de bactéries pneumocoques et est approuvé par Santé Canada.

Le vaccin VCP-13 est offert gratuitement dans le cadre du programme de vaccination systématique de votre enfant. Pour prendre rendez-vous, appelez l'infirmière de la santé publique ou votre médecin.

Qui devrait recevoir le vaccin VCP-13?

Le vaccin VCP-13 est administré en trois doses ou injections. Les enfants reçoivent la première dose à l'âge de deux mois, la deuxième à l'âge de quatre mois et la troisième à l'âge de douze mois. Le vaccin est administré en même temps que les autres vaccins des enfants.

Vaccin VCP-13	Âge de l'enfant à la vaccination
1 ^{re} dose	2 mois
2 ^e dose	4 mois
3 ^e dose	12 mois

Une dose supplémentaire de vaccin est administrée aux enfants âgés de six mois :

- qui n'ont pas de rate, ou dont la rate ne fonctionne pas correctement;
- qui souffrent de drépanocytose, également appelée anémie falciforme;

- dont le système immunitaire est affaibli par une maladie ou par un traitement médical;
- qui souffrent d'une maladie du foie chronique, dont la cirrhose, l'hépatite B chronique ou l'hépatite C;
- qui souffrent d'une maladie chronique du rein, du cœur ou des poumons;
- qui ont eu une greffe de cellules des îlots pancréatiques ou d'un organe entier, ont reçu un implant cochléaire (oreille interne) ou attendent d'en recevoir un;
- qui ont reçu une greffe de cellules souches;
- dont le problème médical fait en sorte qu'il leur est difficile d'éliminer les liquides présents dans la bouche ou la gorge; ou
- qui souffrent de diabète, de mucoviscidose (fibrose kystique) ou d'une fuite chronique du liquide cérébro-spinal.

Les enfants de moins de cinq ans qui souffrent de l'un des problèmes de santé énumérés ci-dessus et qui ont reçu la série de doses du vaccin VCP-7 devraient aussi recevoir une dose de vaccin VCP-13.

À l'âge de deux ans, un enfant qui souffre de l'un des problèmes médicaux énumérés ci-dessus devrait aussi recevoir une dose du vaccin antipneumococcique polysaccharidique, qui le protégera d'un plus grand nombre de types de bactéries pneumococciques. Pour en savoir plus, consultez la HealthLink BC File (fiche santé de la C.-B.) [n° 62b Le vaccin antipneumococcique polysaccharidique.](#)

Il est important de garder un registre de tous les vaccins administrés.

Avantages du vaccin VCP-13

Le vaccin VCP-13 constitue le meilleur moyen de protéger votre enfant contre les infections pneumococciques, des infections graves et parfois mortelles.

Lorsque vous faites vacciner votre enfant, vous contribuez aussi à protéger les autres.

Réactions possibles au vaccin VCP-13

Les vaccins sont très sûrs. En fait, il est bien plus sûr de se faire vacciner que d'attraper une infection pneumococcique.

Les réactions courantes à ce vaccin peuvent comprendre de la douleur, de la rougeur et de l'enflure au point d'injection. Certains enfants peuvent aussi avoir de la fièvre, être somnolents, être grincheux ou perdre l'appétit. Ces réactions sont bénignes et durent habituellement de une à deux journées.

Au Canada, on n'a pas constaté d'augmentation de crises d'épilepsie causées par la fièvre chez les enfants après l'administration simultanée du vaccin VCP-13 et du vaccin contre la grippe. Toutefois, aux États-Unis, un petit nombre d'enfants, soit environ un sur 2 000 ou 3 000, ont eu des crises d'épilepsie après avoir reçu ces vaccins ensemble. Les crises ne sont pas néfastes pour la santé.

En cas de fièvre ou de douleur, on peut donner de l'acétaminophène ou du Tylenol^{MD}. On ne doit PAS donner d'AAS ou d'aspirine aux moins de 20 ans en raison des risques de syndrome de Reye.

Il est important de demeurer dans la clinique pendant 15 minutes après avoir reçu le vaccin, en raison de la possibilité très rare d'une réaction allergique mortelle appelée anaphylaxie. Cette réaction peut comprendre de l'urticaire, des difficultés respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Si cela se produit après votre départ de la clinique, composez le 9-1-1 ou le numéro d'urgence de votre région. Cette réaction peut être traitée et survient chez moins d'une personne vaccinée sur un million.

Signalez toute réaction grave ou inattendue à votre fournisseur de soins de santé.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin VCP-13?

Si votre enfant a déjà eu une réaction allergique qui aurait pu être fatale à une dose antérieure du vaccin contre le pneumocoque, ou à une de ses composantes, adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé.

Que sont les infections pneumococciques?

Les infections pneumococciques sont causées par un germe (une bactérie). Cette bactérie peut provoquer des infections graves pouvant être mortelles, dont la

méningite, une infection de la membrane qui entoure le cerveau, ou la septicémie, une infection du sang. Sur 30 enfants qui attraperont une infection de ce genre, un en mourra. Les complications permanentes peuvent comprendre des dommages au cerveau ou la surdité.

Les infections pneumococciques se transmettent d'une personne à l'autre par la toux, les éternuements et par les contacts rapprochés. Elles peuvent aussi se propager par la salive ou les crachats, lorsqu'on partage des aliments ou des boissons. Les bébés et les jeunes enfants peuvent tomber malades après avoir partagé des tétines, des biberons ou des jouets utilisés par d'autres enfants.

Grâce aux programmes de vaccination systématique durant l'enfance, les infections pneumococciques sont maintenant rares chez les enfants en Colombie-Britannique.

Pour plus de renseignements sur la vaccination, visitez Immunize BC, à www.immunizebc.ca.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLink BC File, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ou votre unité de santé publique locale.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et des services de santé non urgents, cliquez sur www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 en C.-B.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1 en C.-B.

Des services de traduction dans plus de 130 langues sont disponibles sur demande.