



L'impétigo Impetigo

Qu'est-ce que l'impétigo?

L'impétigo est une infection de la peau qui est commune chez les enfants et qui se produit le plus souvent en été. Elle est présente partout dans le monde et est souvent causée par une bactérie qui s'introduit dans des égratignures, des boutons de fièvre (ou feux sauvages), des piqûres d'insectes ou des plaques d'eczéma.

À quoi l'impétigo ressemble-t-il?

Un enfant atteint d'impétigo a une éruption cutanée se présentant sous la forme d'un groupe de petites pustules ou de boutons rouges. Une fois que les pustules apparaissent, elles éclatent généralement et du liquide en sort. Lorsque ce liquide sèche, les pustules se couvrent d'une croûte jaune ou grise. La zone boursouflée est généralement entourée de rougeurs. L'éruption se propage si elle n'est pas traitée.

Cette éruption apparaît généralement autour du nez, de la bouche ou ailleurs sur le visage. Elle peut aussi apparaître sur des parties de la peau qui ne sont pas couvertes de vêtements comme les bras et les jambes.

Dans les cas d'impétigo sévère, les ganglions lymphatiques peuvent enfler sur le visage ou dans le cou. Ce gonflement est accompagné de fièvre.

Est-ce grave?

Généralement, l'impétigo est une infection bénigne. À part des démangeaisons occasionnelles, les enfants atteints d'impétigo ne seront pas trop gênés.

L'impétigo est très contagieux. Les nourrissons et les personnes âgées courent un plus grand risque d'attraper l'infection après avoir été en contact avec une personne infectée. Dans de rares cas, l'impétigo peut infecter le sang, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale chez l'enfant.

Comment se propage-t-il?

L'impétigo passe facilement d'une personne à une autre. L'infection se transmet par le contact avec la peau. Par exemple, lorsque quelqu'un touche l'éruption avec sa main et touche ensuite une autre personne, cela peut propager l'infection. L'éruption peut apparaître dans un délai d'un à dix jours après l'infection.

Suivez des règles d'hygiène personnelles scrupuleuses lorsqu'un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez est infecté. Très important : vous devez vous laver les mains après avoir touché l'éruption puisque l'impétigo se transmet facilement lors de contacts main à main.

De même, un enfant infecté ne doit pas partager de serviette, de vêtement ou de linge pour le visage ou d'articles de toilette comme les peignes, les brosses avec quiconque.

Consultez votre médecin

Si vous pensez que votre enfant a un impétigo, emmenez-le chez le médecin.

Attention de vous protéger et de protéger les autres enfants de tout contact avec l'enfant infecté.

Si votre médecin détermine que votre enfant a l'impétigo, il peut être traité facilement avec des antibiotiques et/ou une crème antibiotique.

Le traitement guérira l'impétigo en cinq jours environ.

Comment les parents peuvent-ils aider?

L'infection est contagieuse dans les crèches, les écoles et les camps de vacances. Un enfant infecté doit rester à la maison.

Si vous savez qu'un autre enfant a un impétigo, surveillez l'apparition de symptômes chez votre enfant et essayez de limiter les contacts de votre enfant avec l'enfant infecté.

Si votre enfant attrape l'impétigo, toutes les personnes vivant à la maison devront se laver les mains soigneusement et fréquemment, surtout après un contact physique.

Il est important de laver les vêtements et les draps de lit de votre enfant séparément et à l'eau chaude. Ils devraient aussi les sécher à la machine, au réglage de température élevé.

On doit conseiller aux enfants atteints d'impétigo de ne pas toucher leurs plaies. Gardez leurs ongles propres et courts. Ils auront également besoin d'aide pour laver leurs mains fréquemment.

Au fur et à mesure que la maladie se développe, les croûtes qui se détachent peuvent être humidifiées durant 15 à 20 minutes à l'aide d'un gant de toilette tiède et humide puis détachées délicatement du corps avec de l'eau et du savon avant d'être essuyées.

REMARQUE : Une fois que votre enfant commence un traitement médicamenteux, il faut attendre au moins 24 heures avant le retour à l'école ou à la crèche. Ceci réduira les chances de contamination d'autres enfants.

Il est important que votre enfant continue à prendre tous les médicaments prescrits jusqu'à leur épuisement — même si l'éruption disparaît.



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLink BC File, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ou votre unité de santé publique locale.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et des services de santé non urgents, cliquez sur www.HealthLinkBC.ca ou composez le **8-1-1** en C.-B.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le **7-1-1** en C.-B.

Des services de traduction dans plus de 130 langues sont disponibles sur demande.