



ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦਾ ਲੋਦਾ 6 ਉਤੇ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Grade 6 and 9 Program

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ (ਵੈਕਸੀਨ) ਕੀ ਹੈ?

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ, ਗੈਰਡਸਿਲਾTM, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਿਕਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ) ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਣਨ-ਅੰਗਾਂ (ਜੈਨੀਟਲਜ਼) ਉਤੇ ਮਹੁਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 9 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2008-2009 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 6 ਅਤੇ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਗ੍ਰੇਡ) ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ ਮੁਫਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ:

- ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਓ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿੰਗਕ (ਸੈਕਸੂਅਲ) ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਲੋਦਾ ਲਵਾ ਲੈਣ।
- ਲੋਦਾ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਫੂਤ) ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
- ਟੀਨਏਜ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਣਨ-ਨਾਲੀ ਅੰਦਰ ਤੈਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਇਹ ਲੋਦਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਦਾ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਲਈ ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਦਾ ਮਰਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਲੋਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਲੋਦੇ ਦੇ ਲਾਭ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਡਸਿਲਾTM ਦਾ ਲੋਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

- ਇਹ ਸਰਵਿਕਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ) ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਸੱਤ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਣਨ-ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਨੌਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੁਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਈਫੈਕਟਸ) ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲੋਦਾ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਲੋਦੇ ਪਿਛੋਂ ਸੰਭਵ ਰੀਐਕਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ)

ਆਮ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਜਸ਼, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਦੇ ਪਿਛੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਾਫਿਲੈਕਸ਼ਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧੱਫੜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਔਖਿਆਈ, ਜਾਂ ਗਲੇ, ਜੀਭ, ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 911 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਪਿਛੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿਚ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਈਫੈਕਟਸ) ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੀਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਟਾਮਿਨੋਫਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਇ ਸਿੰਡਰਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਏ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਐਸਪੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਲੋਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ:

- ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡੋਜ਼ (ਖੁਰਾਕ) ਤੋਂ, ਜਾਂ ਲੋਦੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ (ਸਣੇ ਯੀਸਟ) ਤੋਂ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ।

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਕੀ ਹੈ ਉਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਲਿੰਗਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। **ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਚੌਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।**

ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਜਣਨ-ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਿੰਗਕ ਹਰਕਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

- ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ:

- 150 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- 40 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- 6,000 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਕਸਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 10,000 ਅੰਦਰੂਨੀ (ਇਨਵੇਸਟ) ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ, ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 7-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY