



## ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ Hepatitis C Virus Infection

### ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਸੀ.ਵੀ.) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

### ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ?

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਜਾਂਡਸ (ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ), ਪੇਟ ਦਰਦ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

### ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਈ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਜਾਂ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਹਨ।

- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸੂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 500,000 ਯੂਨਿਟ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

### ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ (ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ) ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

### ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੇ ਸੁੰਗਣ, ਤਮਾਕੂ ਵਾਂਗ ਪੀਣ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ, ਸਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ

ਖੂਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਜਾਂ ਸਰਿੰਜ ਅਚਾਣਕ ਚੁੱਭ ਜਾਣ ਨਾਲ।
- ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 5% ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ)।
- ਸੰਭੋਗ ਸਮੇਂ ਖਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈੱਕਸ ਸਾਥੀ ਹਨ।
- ਟੁੱਥਬੁਰਸ਼, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ (ਫਲਾਸ), ਉਸਤਰਾ, ਨਹੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਲਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ।
- ਜੇ ਉਪਕਰਣ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੋਦਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਟੂਜ਼, ਸਰੀਰ ਛੋਦਣਾ, ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਲਾਂ, ਵੀਰਜ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਤਰਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ।

### ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ?

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ:

- ਖੰਗਣ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ।
- ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣ ਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ।
- ਉਹੀ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਚਿਮਚੇ ਕਾਂਟੇ ਵਰਤਨੇ।
- ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਨਾਲ।
- ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ।
- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਲਾਂ, ਉਲਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ।

ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਿਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਪਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਗ ਸਕੇ।

- ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵੋ।
- ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਓ।

### ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹਾਂ ਪੱਖੀ (ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

### ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਏ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਬੀ, ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।



BC Centre for Disease Control  
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ [www.healthlinkbc.ca/healthfiles/index.stm](http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/index.stm) ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ [www.healthlinkbc.ca](http://www.healthlinkbc.ca) 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 7-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।