



ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ Toxoplasmosis

ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਾਂਡੀਆਈ ਨਾਮਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20% ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਦਨ, ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?

ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਲ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ
- ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ

- ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਲ ਹੋਵੇ
- ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲੈਣੀ।

ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ:

- ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
- ਦੂਸ਼ਿਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਨਾ - ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ HealthLink BC (ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ.) ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜੇ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੋਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਪਾਣੀ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਿਫਲਸ), ਕੜਵੱਲ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਿਆਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ

ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਟੈਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

- ਜਦੋਂ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ (ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਲ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ) ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੋਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘਾ ਲਵੇ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਆਪਣੇ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਪੱਕਾ/ਪੀਡਾ ਢੱਕਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵਰਤੇ।
- ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਕਿਆ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਓ।
- ਕੱਚੇ ਮੀਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
- ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ।
- ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਲ ਵਿਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਪਕੜੇ ਅਤੇ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਰਾ ਜਾਂ ਓਪਰੀ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ. (SPCA) ਜਾਂ ਰਿਊਮੈਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

- ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਲ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।
- ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਲ ਦੀ ਖਾਦ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ।

ਕੀ ਟੈਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ **7-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।