



ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ

ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

Fifth Disease

Parvovirus Infection

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ “ਸਲੈਪਡ ਫੇਸ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ ਬੀ 19 ਨਾਮੀਂ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਰੈਸ਼, ਖੰਘ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ:

- ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੈਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਦਾਗ਼, ਲੇਸ ਵਰਗਾ ਰੈਸ਼ ਬਾਹਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਜਿਵੇਂਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਸ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖੰਘ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ

(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਟਿੱਸੂ) ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਪੁਰਾਣੀ ਹੀਮੋਲਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ (hemolytic anemias) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰੀ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿਫਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਦੀ ਜੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਟਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਟਿਸੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ [HealthLink BC File](#) (ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫ਼ਾਈਲ) [#85 Hand Washing for Parents and Kids](#) ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾ ਵਾਲੇ ਗਰੁਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਬੇਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਇਲਾਜ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਫਥ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
- ਐਸੀਟਾਮੀਨੋਫੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਨੋਲ (Tylenol®) ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਐਸੀਟਾਮੀਨੋਫੇਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਨੋਲ (Tylenol®) ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਸਿਨਡਰੋਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੀਨ (Aspirin®) ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

- ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਖਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਣੋ;
- ਖਾਰਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸ ਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਣੋ। ਖਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨੂੰ ਲੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਖਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ **7-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।