



ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ (CJD) Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD)

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ (CJD) ਕੀ ਹੈ?

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੌਰ ਡੌਰ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸੀ, ਭੁਲਣਾ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨਿਮੋਨੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। 1997 ਅਤੇ 2010 ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 61 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੀਓਨ (prion) - ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਤਹਿ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ - ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਓਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਜਾਂ ਸਪੰਜ ਜਿਹੇ ਪੈਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਓਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

85 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦੱਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10-15% ਮਾਮਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਰੀੜ ਦੇ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਤੰਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰੀੜ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਿਊਰਾਲੋਜਿਸਟ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੰਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਜਾਂ ਸਪੰਜ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਨਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥੈਰਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ (CJD) ਦਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਕ੍ਰਿਊਟਜ਼ਫੈਲਡ-ਜੈਕਬ ਬਿਮਾਰੀ (vCJD) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ?

CJD ਅਤੇ vCJD ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਓਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ vCJD ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। vCJD ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਪਾਗਲ ਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (human mad cow disease) ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨ ਬੋਵਾਈਨ ਸਪੋਂਜੀਫਾਰਮ ਐਨਸੈਫਲੋਪੈਥੀ (human bovine spongiform encephalopathy) (BSE) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ ਸੀ. ਪ੍ਰੀਓਨਜ਼ (BSE prions) ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

vCJD ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ HealthLink BC File (ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲ) [#55b Variant Creutzfeldt-Jakob Disease\(vCJD\)](#) ਦੇਖੋ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲਜ਼ੀਮੇਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.alzheimer.ca/en/About-dementia/Dementias/Creutzfeldt-Jakob-Disease ਤੇ ਐਲਜ਼ੀਮੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਗਲਪਣ (CJD) ਦਾ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੇਖੋ।



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 7-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।