



## ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ Managing Constipation in Adults

### ਕਬਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਫ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।

### ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।

### ਕਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਘੱਟ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ
- ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਪੀਣੇ
- ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਘਾਟ
- ਉਦਾਸੀਨਤਾ
- ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ
- ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਜਾਣਾ
- ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
- ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੰਪੂਰਕ, ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਐਕਸਿਡ, ਉਦਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ (ਐਂਟੀਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟ), ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨਜ਼ (antihistamines), ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਐਂਟੀਸਪਾਸਮੋਡਿਕ (antispasmodics), ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ।
- ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਤ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ਼

(irritable bowel syndrome), ਥਾਈਰਾਇਡ ਦਾ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (multiple sclerosis), ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਛੋਟੀ ਅੰਤ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ (celiac disease) ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੁਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (hemorrhoids)।

### ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਉ:

- ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਤ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਾਂ
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

### ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਲ (ਟੱਟੀ) ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਾਉ। ਇੱਕ ਦਮ ਰੋਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਉ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪੀਉ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਕੱਪ/2.25 ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 12 ਕੱਪ/3 ਲਿਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

### ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੁਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੀਆਂ,

ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

### ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਕਰੈਕਰਜ਼, ਬੇਗਲਜ਼, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਚੌਲ।
- ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ (ਸੀਰੀਅਲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ - ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ।
- ਫਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਮਟਰ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
- ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ। ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਬਰੈਨ ਮਫਿਨਜ਼ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰੋਸਿਸ ਕੀਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਛਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ।
- ਕਣਕ ਦਾ ਛਾਣ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ, ਮੀਟ ਲੋਫ ਜਾਂ ਕੈਸਰੋਲ ਜਿਹੇ ਖਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ 15-30 ਮਿ.ਲਿ. (1-2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) ਕਣਕ ਦਾ ਛਾਣ ਧੂੜੇ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 15-30 ਮਿ.ਲਿ. (1-2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਪਰੂਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?

ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰੂਨ ਖਾਉ। ਪਰੂਨ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਘੋਲ (ਲੁਗਦੀ) ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਮਿਲਾਉ :

250 ਮਿ.ਲਿ. (1 ਕੱਪ) ਪਰੂਨ

250 ਮਿ.ਲਿ. (1 ਕੱਪ) ਕਿਸਮਿਸ਼/ਸੋਗੀ

250 ਮਿ.ਲਿ. (1 ਕੱਪ) ਖਜੂਰਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿੱਜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ:

125 ਮਿ.ਲਿ. (1/2 ਕੱਪ) ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ

150 ਮਿ.ਲਿ. (2/3 ਕੱਪ) ਪਰੂਨ ਦਾ ਜੂਸ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।

250 ਮਿ.ਲਿ. (1 ਕੱਪ) ਆਟੇ ਦਾ ਛਾਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ/ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਸਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਕਬਜ਼ੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?

ਕਬਜ਼ੀ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਬਗੋਲ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੈਟਾਮੂਸਿਲ® ਜਾਂ ਬੇਨਫਾਈਬਰ™ (Metamucil® or Benefibre™)। ਹੋਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

### ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm) ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 7-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।