



Infección del Virus del Papiloma Humano (VPH) Human Papillomavirus (HPV) Infection

¿Qué es la infección del VPH?

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes. Existen más de 100 tipos de VPH. Dos tipos causan el 70 por ciento de los cánceres de cuello uterino en la mujer. Otros dos tipos causan el 90 por ciento de las verrugas genitales en mujeres y hombres.

¿Cómo se contagia el VPH?

El VPH se contagia de una persona a otra por medio del contacto directo de la piel durante la actividad sexual oral, vaginal o anal. No es necesario tener relaciones sexuales para contagiarse del VPH.

El VPH puede infectar toda el área genital y la piel de alrededor. Esto incluye la vagina, cuello uterino, recto, pene, vulva y ano. Es posible tener más de un tipo de infección del VPH al mismo tiempo.

¿Cuáles son los síntomas del VPH?

La mayoría de las personas no muestran ninguna señal o síntoma de infección del VPH, y pueden contagiar a otros sin saberlo.

¿Qué tan comunes son las infecciones del VPH?

Tres de cada cuatro mujeres sexualmente activas contraerán al menos 1 infección del VPH en algún momento de sus vidas. Entre más compañeros sexuales tenga,

mayor es su riesgo de contagiar el virus y de contraer una infección del VPH.

¿Cuáles son los riesgos de una infección del VPH?

La mayoría de las mujeres que tienen una infección del VPH en el cuello uterino la eliminan en un lapso de 2 años. Pero cuando no es eliminada, las células del cuello uterino que están infectadas con el VPH pueden volverse cancerosas en un lapso de 1 a 20 años.

Cada año en BC:

- 150 mujeres contraerán cáncer del cuello uterino.
- 40 mujeres morirán a causa de la enfermedad.
- 6,000 mujeres desarrollarán cambios de alto riesgo en el cuello uterino, los cuales son pre-cancerosos.
- 10,000 procedimientos invasivos serán llevados a cabo para impedir que se desarrolle cáncer en el cuello uterino.

¿Cuál es el tratamiento para el VPH?

No existe ningún tratamiento, pero algunos tipos específicos de infecciones del VPH se pueden prevenir por medio de la vacuna contra el VPH. Tanto mujeres como niñas están mejor protegidas cuando se les aplica la vacuna contra el VPH antes de que comiencen a estar sexualmente activas.

La vacuna contra el VPH se recomienda para niñas y mujeres de entre 9 y 26 años

de edad, antes de que entren en contacto con el VPH. La vacuna previene la infección del VPH, pero no la elimina una vez que la infección ha ocurrido.

Es importante que las mujeres se sometan periódicamente a la prueba del Papanicolaou una vez que comiencen a estar sexualmente activas, ya que la vacuna contra el VPH no protege contra todos los tipos de cáncer del cuello uterino.

¿A quién se le debe de aplicar la vacuna contra el VPH?

A partir del año escolar 2008-2009, la vacuna contra el VPH se proporcionará de manera gratuita a niñas que estén en los grados 6 y 9 en BC.

La vacuna también puede beneficiar a mujeres que se encuentran sexualmente activas y que aún no se han infectado con el VPH.

Las mujeres que no tengan cobertura por medio del programa escolar, por favor hablen con su médico.

¿Cómo puedo reducir el riesgo de contraer el VPH?

- Aplíquese la vacuna contra el VPH.
- Siempre utilice un condón cuando tenga actividad sexual.
- Retrase el inicio de la actividad sexual.

Para obtener más información

Para obtener más información, consulte los siguientes HealthLink BC Files:

[#101b Vacuna Contra el Virus del Papiloma Humano \(VPH\) Programa para los grados 6 y 9](#)

[#08k Genital Warts](#)

[#08C Pelvic Inflammatory Disease \(PID\)](#)



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (HealthLink BC File) diríjase a: www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: www.HealthLinkBC.ca o llame al **8-1-1**.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.