



Vacuna contra la polio (IPV) Polio Vaccine (IPV)

Las vacunas han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquiera otra medida sanitaria.

¿Qué es la vacuna contra la polio (IPV por sus siglas en inglés)?

La vacuna contra la polio protege contra la infección del virus de la polio. La vacuna, llamada vacuna contra la polio inactivada (IPV por sus siglas en inglés), ha sido aprobada por Health Canada.

¿Quiénes deberían recibir la vacuna contra la polio?

La vacuna contra la polio se coloca generalmente como una dosis o inyección de refuerzo a adultos que han recibido una serie de vacunas contra la polio durante la infancia y van a viajar o trabajar en un lugar del mundo donde todavía se puede contraer la polio.

Se puede colocar una serie de dosis de vacunas contra la polio a personas que todavía no han recibido la vacuna pero que podrían entrar en contacto con el virus de la polio debido a su trabajo o a un viaje.

Una serie de vacunas incluye dos dosis, colocadas con 4 a 8 semanas de diferencia y una tercera dosis que se coloca entre 6 y 12 meses después de la segunda.

En niños pequeños, las vacunaciones contra la polio se combinan con otras vacunas, tales

como contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y *Haemophilus influenza* tipo b. Para más información sobre las vacunas combinadas, consulte el HealthLink BC File [#105 Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, polio y Haemophilus influenza tipo b \(DTaP-HB-IPV-Hib\)](#).

La serie de vacunas contra la polio también se puede aplicar a bebés y niños que ya hayan recibido protección contra la difteria, tétanos, tos ferina y Hib en otras vacunas.

Reacciones posibles a la vacuna

Es mucho más seguro vacunarse que contraer la polio.

Entre las reacciones comunes a la vacuna, están la fiebre y el dolor, la hinchazón o el enrojecimiento en el lugar en que se colocó la inyección.

Para la fiebre y los dolores, se puede dar Acetaminophen o Tylenol®. NO se debe dar AAS o Aspirina® a alguien menor de 20 años de edad debido al riesgo del Síndrome de Reye.

Después de recibir cualquier vacuna, es importante quedarse en la clínica 15 minutos porque hay una posibilidad, aunque rarísima, de que se produzca una reacción alérgica que pone en peligro la vida llamada anafilaxis.

Esto puede incluir urticaria, dificultad para respirar o hinchazón de la garganta, la

lengua o los labios. Si esto ocurre después que sale de la clínica, llame al 911 o al número local para emergencias. Esta reacción puede ser tratada y se produce en menos de una persona en un millón que han recibido la vacuna.

Sírvase informar cualquier reacción inesperada o seria, a su enfermera o médico de salud pública.

¿Quiénes no deberían recibir la vacuna contra la polio?

Consulte a su enfermera o a un médico de salud pública si ha tenido una reacción con peligro de muerte a una dosis previa de la vacuna contra la polio o a cualquier componente de la vacuna, incluyendo la neomicina, estreptomina o polimixina B.

¿Qué es la polio?

La polio es una enfermedad causada por una infección de virus de la polio. Aunque algunas infecciones de polio no exhiben síntomas, otras pueden redundar en parálisis de brazos o piernas e incluso la muerte.

El virus de la polio se encuentra en la materia fecal de las personas infectadas. Si la materia fecal infecta las manos, el agua o la comida, otros resultarán infectados.

Debido a la vacunación, en muchas partes del mundo se ha eliminado la polio. En 1994, Canadá fue certificado como un país “sin polio”. En los últimos 30 años, los únicos casos de polio en British Columbia fueron los de residentes que no estaban vacunados que tuvieron contacto con visitas infectadas con la polio de otros países.

Consentimiento de menor maduro

Se recomienda que los padres o tutores y sus hijos hablen sobre el consentimiento para la vacunación. Se hace lo posible por buscar primero el consentimiento de los padres/tutores o representantes antes de la vacunación. Sin embargo, los niños menores de 19 años que puedan entender los beneficios y las posibles reacciones de cada vacuna y el riesgo de no vacunarse, pueden dar su consentimiento a las vacunas o rechazarlas legalmente.

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (HealthLink BC File) diríjase a: www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: www.HealthLinkBC.ca o llame al **8-1-1**.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY