

Inmunoglobulina de la hepatitis B

Hepatitis B Immune Globulin

¿Qué es la inmunoglobulina de la hepatitis B?

La inmunoglobulina de la hepatitis B ofrece protección inmediata a corto plazo contra la infección de la hepatitis B. La inmunoglobulina de la hepatitis B tiene grandes cantidades de anticuerpos de la hepatitis B tomados de sangre humana donada. Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunitario de una persona forma para combatir los gérmenes, tales como bacterias y virus como la hepatitis B.

La inmunoglobulina de la hepatitis B está aprobada por Health Canada (departamento de salud de Canadá).

¿Es segura la inmunoglobulina de la hepatitis B?

Si, Canadian Blood Services (departamento canadiense de servicios sanguíneos) somete a revisión y analiza todas las donaciones de sangre. Desde que comenzó la revisión y análisis de la sangre, no ha habido ningún reporte de infecciones transmitidas por la sangre como el VIH o la hepatitis B en personas que reciben inmunoglobulina de la hepatitis B.

¿Quién debe recibir inmunoglobulina de la hepatitis B?

Si ha estado expuesto al virus de la hepatitis B y no ha recibido la vacuna de la hepatitis B en el pasado, debe recibir 1 dosis o inyección de inmunoglobulina de la hepatitis B.

La inmunoglobulina de la hepatitis B funciona mejor si se administra lo antes posible y en un plazo de 14 días a partir de la exposición al virus de la hepatitis B.

La inmunoglobulina de la hepatitis B se recomienda para los siguientes casos:

- Personas expuestas a sangre que se sabe o se sospecha que está infectada con el virus de la hepatitis B al:
 - picarse con una aguja de inyección usada
 - salpicarse en la boca, nariz u ojos con sangre infectada
 - recibir una mordida de alguien que tiene hepatitis B, o
 - tener contacto con artículos en el hogar, como cepillos de dientes, hilo dental, o rastrillos para rasurar contaminados con sangre de una persona infectada.
- Personas que han tenido contacto sexual íntimo con una persona que tiene hepatitis B
- Víctimas de una agresión sexual
- Recién nacidos y bebés menores de 12 meses de edad que cuyas madres tienen hepatitis B
- Recién nacidos cuyas madres tienen alto riesgo de infección de hepatitis B, como consumidoras de drogas inyectadas o trabajadoras sexuales.

Se puede administrar una dosis de la vacuna de la hepatitis B al mismo tiempo que la inmunoglobulina de la hepatitis B. Se pueden administrar dos dosis más de la vacuna de la hepatitis B posteriormente para ofrecer protección completa a largo plazo contra la infección. Hable con su proveedor de atención médica sobre cuándo recibir estas dosis. Para obtener más información, consulte el HealthLink BC File [#25a Vacuna de la hepatitis B](#).

¿Cuáles son los beneficios de la inmunoglobulina de la hepatitis B?

La inmunoglobulina de la hepatitis B ofrece protección inmediata a corto plazo contra la infección de la hepatitis B. Puede prevenir la infección o hacer que la enfermedad sea menos grave.

¿Cuáles son las posibles reacciones después de la inmunoglobulina?

Las reacciones comunes a la inmunoglobulina de la hepatitis B pueden incluir dolor y comezón en el sitio donde se aplicó la inyección. También puede presentarse una fiebre leve o malestar general.

Se puede dar acetaminofén o Tylenol® para la fiebre o el dolor. NO se debe dar AAS o Aspirina® a nadie menor de 20 años de edad debido al riesgo del Síndrome de Reye.

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna o inyección porque existe la posibilidad poco común de que ocurra una reacción alérgica potencialmente mortal llamada anafilaxia. Puede incluir urticaria, dificultad para respirar o hinchazón de la garganta, lengua o labios. Si esto ocurre después de abandonar la clínica, llame al 9-1-1 o al número de emergencia local. Esta reacción tiene tratamiento y le ocurre a menos de una de cada millón de personas que reciben la inyección.

Es importante que siempre reporte las reacciones graves o inesperadas a su proveedor de atención médica.

¿Quién no debe recibir la inmunoglobulina de la hepatitis B?

Hable con su proveedor de atención médica si ha:

- sido vacunado contra el sarampión, paperas, rubéola (MMR, por su sigla en inglés) o varicela en el transcurso de los últimos 14 días.
- tenido una reacción potencialmente mortal a una dosis anterior de cualquier inmunoglobulina, cualquiera de sus componentes o al látex.

¿Qué es la infección de la hepatitis B?

La hepatitis B es un virus que ataca el hígado. Puede causar enfermedades graves, entre ellas daño hepático permanente, también conocido como cirrosis. La hepatitis B también es la causa principal del cáncer hepático, el cual puede ser mortal. El virus de la hepatitis B se transmite de

una persona infectada a otra mediante el contacto con la sangre o los fluidos corporales. Después de que el virus entra a su cuerpo, los síntomas o signos de la enfermedad normalmente tardan de 2 a 3 meses en desarrollarse. Muchas personas que contraen la hepatitis B no presentan síntomas y podrían no saber que tienen la enfermedad. Ya sea que tenga o no signos de la enfermedad, puede transmitir el virus a los demás.

Consentimiento de menor maduro

Se recomienda que los padres o tutores y sus hijos hablen sobre el consentimiento para la inmunización. Se hace lo posible por solicitar primero el consentimiento de los padres/tutores o representantes antes de la inmunización. Sin embargo, los niños menores de 19 años de edad que puedan comprender los beneficios y posibles reacciones de cada vacuna y el riesgo de no vacunarse pueden autorizar o rechazar legalmente las inmunizaciones.

Para obtener más información sobre las inmunizaciones, visite Immunize BC (inmunización en la Colombia Británica) en www.immunizebc.ca.

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (BC HealthFile topics) diríjase a: www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: www.HealthLinkBC.ca o llame al 8-1-1.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY