



Vacuna de la hepatitis A

Hepatitis A Vaccine

Las vacunas han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida sanitaria.

¿Qué es la vacuna de la hepatitis A?

La vacuna de la hepatitis A protege contra la infección a causa del virus de la hepatitis A. La vacuna está aprobada por el departamento de salud de Canadá (Health Canada).

¿Quién debe recibir la vacuna de la hepatitis A?

La vacuna de la hepatitis A se administra a los 6 meses de edad y en adelante. La vacuna se administra en 2 dosis o inyecciones. La segunda dosis se administra al menos 6 meses después de la primera.

Debido a los brotes recurrentes de hepatitis A en las comunidades aborígenes de la Colombia Británica (B.C.) en los últimos 15 años, la vacuna de la hepatitis A se ofrecerá a los niños aborígenes que viven tanto dentro como fuera de las reservas a partir del 1.º de enero de 2012.

La vacuna de la hepatitis A se ofrece sin costo a las personas que tienen un riesgo alto de infección, entre ellas:

- Aquellos que tienen hemofilia o reciben repetidas infusiones de sangre o productos sanguíneos
- Aquellos que se inyectan drogas o comparten equipo para inhalar, fumar o inyectarse drogas
- Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres
- Aquellos que tienen la infección del VIH, hepatitis B o hepatitis C, o enfermedad crónica del hígado
- Aquellos que han recibido un trasplante de médula ósea o de células madre
- Aquellos que han recibido o que recibirán un trasplante de hígado

- Presos de instalaciones correccionales
- Contactos allegados a una persona que tiene la infección de la hepatitis A. Estos incluyen personas que viven en la misma casa, parejas sexuales, amigos cercanos y niños que asisten a la misma guardería
- Aquellos que han consumido alimentos preparados por una persona que tiene la infección de la hepatitis A
- Niños y adolescentes aborígenes de 6 meses a 18 años de edad. Los bebés reciben su primera dosis a los 6 meses de edad y la segunda a los 18 meses. Los niños mayores necesitan 2 dosis de la vacuna con al menos 6 meses de diferencia entre las dosis

Si ha estado potencialmente expuesto a la hepatitis A deberá recibir una dosis de la vacuna dentro de los 14 días posteriores a la exposición para prevenir la enfermedad.

La vacuna también está recomendada, pero no se ofrece sin costo, para personas que tienen probabilidades de entrar en contacto con el virus de la hepatitis A o de transmitirlo, entre ellas:

- Aquellos que viven, trabajan o viajan a países en vías de desarrollo, especialmente en áreas rurales
- Personas que preparan alimentos
- Aquellos que tienen múltiples parejas sexuales
- Residentes y personal de instituciones para personas con discapacidades de desarrollo con un problema constante de infección de la hepatitis A
- Guardianes de zoológicos, veterinarios e investigadores que manejan primates
- Aquellos que participan en la investigación del virus de la hepatitis A, o la producción de la vacuna de la hepatitis A.

Es importante conservar un registro de todas las inmunizaciones recibidas.

Ventajas de la vacuna de la hepatitis A

La vacuna es la mejor manera de protegerse contra la infección de la hepatitis A.

Al vacunarse, también ayuda a proteger a los demás.

Posibles reacciones después de la vacuna

Las vacunas son muy seguras. Es mucho menos riesgoso recibir la vacuna que contraer la hepatitis A.

Algunas reacciones comunes a la vacuna pueden incluir dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio donde se aplicó la inyección. También se podría presentar dolor de cabeza, fatiga, fiebre y molestia estomacal después de recibir la vacuna. Estas reacciones son leves y normalmente duran de 1 a 2 días.

Se puede dar acetaminofén o Tylenol® para la fiebre o el dolor. NO se debe dar AAS o Aspirina®, a ninguna persona menor de 20 años de edad debido al riesgo del síndrome de Reye.

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna porque existe la posibilidad extremadamente inusual de que ocurra una reacción alérgica llamada anafilaxia que puede poner en peligro la vida. Puede incluir urticaria, dificultad para respirar o inflamación de la garganta, lengua o labios. Si esto ocurre después de haber abandonado la clínica, llame al 911 o al número de emergencia local. Existe tratamiento para esta reacción y le ocurre a menos de 1 de cada millón de personas que reciben la vacuna.

Siempre reporte cualquier reacción grave o inesperada a su proveedor de atención médica.

¿Quién no debe recibir la vacuna?

Hable con su proveedor de atención médica si ha tenido una reacción potencialmente mortal a una dosis anterior de la vacuna de la hepatitis A, o a cualquier componente de la vacuna, incluyendo la neomicina, o al látex.

¿Qué es la hepatitis A?

La hepatitis A es un virus que ataca el hígado. De cada 1,000 personas infectadas, entre 1 y 3 mueren. La tasa de mortalidad es más alta en personas de 50

años de edad o mayores.

El virus de la hepatitis A se encuentra en las evacuaciones (deposiciones) de las personas infectadas. Las personas con la infección de la hepatitis A que usan el baño y no se lavan las manos adecuadamente pueden transmitir el virus a los demás mediante la preparación de alimentos u otro contacto entre las manos y la boca. La enfermedad también puede transmitirse mediante el contacto sexual o al compartir equipo para el consumo de drogas, como agujas o pipas.

La hepatitis A también puede transmitirse al beber agua contaminada, o al consumir mariscos crudos o que no se han cocido adecuadamente, como cangrejo, almejas, ostiones o mejillones, que se han contaminado con aguas negras.

Consentimiento de menor maduro

Se recomienda que los padres o tutores y sus hijos hablen sobre el consentimiento para la inmunización. Se hace lo posible por solicitar el consentimiento de los padres/tutores o representantes antes de la inmunización. Sin embargo, los niños menores de 19 años de edad que puedan comprender los beneficios y posibles reacciones de cada vacuna y el riesgo de no inmunizarse pueden legalmente dar su consentimiento para las inmunizaciones o rechazarlas.

Para obtener más información sobre la vacunación, visite Immunize BC en www.immunizebc.ca.

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (BC HealthFile topics) diríjase a: www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: www.HealthLinkBC.ca o llame al 8-1-1.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY