



Vacuna neumocócica conjugada (PVC 13)

Pneumococcal Conjugate (PCV 13) Vaccine

**Mantenga seguro a su niño.
Vea que reciba todas sus vacunas a tiempo.**

Al recibir sus vacunas a tiempo, su niño puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

Las vacunas han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida sanitaria.

¿Qué es la vacuna PCV 13?

La vacuna PCV 13 sustituye a la vacuna PCV 7 que se ha usado en la Colombia Británica (B.C.) desde 2003. La vacuna PCV 13 protege contra 13 tipos de bacterias neumocócicas. La vacuna está aprobada por el departamento de salud de Canadá (Health Canada).

La vacuna PCV 13 se ofrece sin costo alguno como parte de las vacunas de rutina de su hijo. Llame a su médico o enfermera de salud pública local para hacer una cita.

¿Quién debe recibir la vacuna PCV 13?

La vacuna PCV 13 se administra en una serie de tres dosis o inyecciones. Los niños reciben la primera dosis a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 12 meses. La vacuna se administra al mismo tiempo que otras vacunas infantiles.

Vacuna PCV 13	Edad del niño al momento de la vacunación
1. ^a dosis	2 meses
2. ^a dosis	4 meses
3. ^a dosis	12 meses

Se administra una dosis adicional de la vacuna a los seis meses de edad a los niños que:

- no tienen bazo, o cuyo bazo no funciona

adecuadamente;

- tienen una enfermedad de células falciformes;
- tienen el sistema inmunológico debilitado por una enfermedad o tratamiento médico;
- tienen enfermedad hepática crónica, incluyendo cirrosis, hepatitis C o hepatitis B crónica;
- tienen enfermedad renal, cardíaca o pulmonar crónica;
- tienen un trasplante de célula de islote u órgano sólido, o un implante coclear (oído interno), o que estén en espera de uno;
- han tenido un trasplante de células madre;
- tienen un padecimiento que les dificulta despejar líquidos de la boca o la garganta; o
- tienen diabetes, fibrosis quística o una pérdida crónica de líquido cefalorraquídeo.

Los niños menores de 5 años de edad que tienen alguno de los padecimientos de salud anteriores y que han completado una serie de la vacuna PCV 7 también deben recibir una dosis de la vacuna PCV 13.

A los 2 años de edad, los niños que tengan los padecimientos anteriores también deben recibir una dosis de la vacuna neumocócica polisacárida, la cual protege contra más tipos de bacterias neumocócicas. Para obtener más información, consulte el HealthLink BC File

[#62b Vacuna neumocócica polisacárida.](#)

Es importante llevar un registro de todas las vacunas recibidas.

Beneficios de la vacuna PCV 13

La vacuna PCV 13 es la mejor manera de proteger a su hijo contra la enfermedad neumocócica, una enfermedad grave y en ocasiones mortal.

Al vacunar a su hijo, también ayuda a proteger a los demás.

Posibles reacciones después de la vacuna PCV 13

Las vacunas son muy seguras. Es mucho menos riesgoso recibir la vacuna que contraer la enfermedad neumocócica.

Algunas reacciones comunes a la vacuna pueden incluir dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio donde se aplicó la inyección. Algunas personas también podrían presentar fiebre o somnolencia, irritabilidad o pérdida de apetito. Estas reacciones son leves y por lo regular duran entre 1 y 2 días.

En Canadá, no se ha observado un aumento en las convulsiones causadas por fiebre en niños después de recibir la vacuna PCV 13 y la vacuna contra la influenza al mismo tiempo. Sin embargo, en los Estados Unidos, una pequeña cantidad de niños, alrededor de 1 de cada 2,000 a 3,000, han tenido convulsiones después de recibir estas vacunas juntas. Estas convulsiones no son dañinas.

Se puede dar acetaminofén o Tylenol® para la fiebre o el dolor. NO se debe dar AAS o Aspirina®, a ninguna persona menor de 20 años de edad debido al riesgo del síndrome de Reye.

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna porque existe la posibilidad extremadamente inusual de que ocurra una reacción alérgica llamada anafilaxia que puede poner en peligro la vida. Puede incluir urticaria, dificultad para respirar o inflamación de la garganta, lengua o labios. Si esto ocurre después de haber abandonado la clínica, llame al 911 o al número de emergencia local. Existe tratamiento para esta reacción y le ocurre a menos de 1 de cada millón de personas que reciben la vacuna.

Reporte cualquier reacción grave o inesperada a su proveedor de atención médica.

¿Quién no debe recibir la vacuna PCV 13?

Hable con su proveedor de atención médica si su hijo ha tenido una reacción potencialmente mortal a una dosis anterior de la vacuna neumocócica, o a cualquier componente de la vacuna.

¿Qué es la infección neumocócica?

La infección neumocócica es causada por un germen o bacteria. Puede causar infecciones graves y potencialmente mortales, incluyendo la meningitis, una infección del revestimiento que cubre el cerebro, y la septicemia, una infección de la sangre. De cada 30 niños que contraen una enfermedad neumocócica, 1 muere. Las complicaciones permanentes de la infección incluyen daño cerebral y sordera.

La infección neumocócica se transmite de una persona a otra al toser, estornudar o mediante el contacto directo cara a cara. También puede transmitirse mediante la saliva cuando las personas comparten alimentos o bebidas. Los bebés y los niños pueden enfermarse cuando comparten chupones, biberones o juguetes que han usado otros niños.

La enfermedad neumocócica es ahora poco común en B.C. debido a los programas de vacunación infantil de rutina.

Para obtener más información, visite el sitio de vacunación Immunize BC en www.immunizebc.ca.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

Para leer acerca de otros temas en los Folletos de Salud de BC (BC HealthFile topics) diríjase a: www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm o contacte su unidad local de salud pública.

Para obtener información y familiarizarse con los servicios de salud en B.C. (en casos que no constituyen emergencia) visite: www.HealthLinkBC.ca o llame al 8-1-1.

La línea telefónica de B.C. para personas sordas o con problemas de audición es 7-1-1.

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los requieran.