



Thuốc Chủng Ngừa Sốt Tê Liệt (IPV) Polio Vaccine (IPV)

Chủng ngừa đã cứu được nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe.

Thuốc chủng ngừa sốt tê liệt (IPV) là gì?

Thuốc chủng ngừa sốt tê liệt bảo vệ chống nhiễm siêu vi khuẩn sốt tê liệt. Thuốc chủng này, được gọi là Thuốc Chủng Ngừa Sốt Tê Liệt Bất Hoạt (Inactivated Polio Vaccine (IPV)), được Health Canada (Bộ Y Tế Canada) phê chuẩn.

Ai nên chủng ngừa sốt tê liệt?

Thuốc chủng ngừa sốt tê liệt hầu như chỉ được dùng để chủng tăng cường hoặc tiêm cho người lớn nào đã chủng ngừa một loạt thuốc chủng sốt tê liệt từ nhỏ và sẽ đi làm việc hoặc du lịch đến một khu vực trên thế giới vẫn còn xảy ra sốt tê liệt.

Có thể chủng một loạt thuốc ngừa sốt tê liệt cho những người chưa chủng và có thể tiếp xúc với siêu vi khuẩn sốt tê liệt khi làm việc hoặc du lịch.

Một loạt thuốc chủng này gồm hai liều, chủng cách nhau từ 4 đến 8 tuần, và liều thứ ba được chủng từ 6 đến 12 tháng sau liều thứ nhì.

Ở trẻ nhỏ, thuốc chủng ngừa sốt tê liệt được kết hợp với các loại thuốc chủng khác, chẳng hạn như bạch hầu, sởi uốn ván, ho gà, viêm gan loại B và *Trực khuẩn gây viêm*

màng não loại b (Hib). Muốn biết thêm chi tiết về các loại thuốc chủng kết hợp, hãy đọc các HealthLink BC File [#105 Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sởi Uốn Ván, Ho Gà, Viêm Gan Loại B, Sốt Tê Liệt, và Trực Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b \(DTaP-HB-IPV-Hib\)](#).

Loại thuốc chủng ngừa sốt tê liệt này cũng có thể được chủng cho trẻ sơ sinh và trẻ em nào đã được bảo vệ chống bạch hầu, sởi uốn ván, ho gà và Hib trong các loại thuốc chủng khác.

Các Phản Ứng Có Thể Xảy Ra Sau Khi Chủng Ngừa

Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với bị bệnh sốt tê liệt.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng có thể gồm sốt, và đau nhức, sưng hoặc tấy đỏ tại chỗ tiêm chủng.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. **KHÔNG** nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA hoặc Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Điều quan trọng là ở lại phòng chủng ngừa 15 phút sau khi chủng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng dị ứng như sốc đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chủng, hãy gọi số 911 hoặc số khẩn cấp địa phương.

Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới một người trong mỗi một triệu người chủng ngừa.

Hãy trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ.

Ai không nên chủng ngừa sốt tê liệt?

Hãy cho ý tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ biết nếu quý vị đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng với một liều thuốc chủng ngừa sốt tê liệt trước đây hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc gồm cả neomycin, streptomycin hoặc polymyxin B.

Sốt tê liệt là gì?

Sốt tê liệt là một căn bệnh do loại siêu vi khuẩn sốt tê liệt gây ra. Tuy một số trường hợp bị nhiễm sốt tê liệt không có triệu chứng, những trường hợp khác có thể gây tê liệt cánh tay hoặc chân và ngay cả làm thiệt mạng.

Siêu vi khuẩn sốt tê liệt có trong phân của người bị nhiễm. Nếu phân dính vào tay, nước hoặc thức ăn thì người khác có thể bị nhiễm.

Nhờ chủng ngừa, sốt tê liệt đã được loại trừ tại nhiều nơi trên thế giới. Vào năm 1994, Canada được chứng nhận là một nước “không có sốt tê liệt”. Trong 30 năm qua, những trường hợp bị sốt tê liệt duy nhất tại British Columbia và vì cư dân không chủng ngừa tiếp xúc với các du khách bị nhiễm sốt tê liệt từ nước khác.

Ứng Thuận của Vị Thành Niên Chính Chấn

Cha mẹ hoặc người giám hộ và các con nên nói chuyện về việc ứng thuận chủng ngừa. Sẽ có nỗ lực xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ ứng thuận trước khi chủng ngừa. Tuy nhiên, trẻ em dưới 19 tuổi nào hiểu được các lợi ích và phản ứng có thể xảy ra của mỗi loại thuốc chủng và rủi ro của việc chủng ngừa sẽ có quyền pháp định được ứng thuận hoặc từ chối chủng ngừa.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY