



# Thuốc Chủng Ngừa *Trực Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b (Hib)* *Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine*

**Giữ an toàn cho con quý vị.  
Chủng ngừa đầy đủ đúng thời hạn.**

Khi chủng ngừa đầy đủ đúng thời hạn, con quý vị có thể được bảo vệ chống nhiều căn bệnh suốt đời.

Chủng ngừa đã cứu được nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe

## Thuốc chủng ngừa Hib là gì?

Thuốc chủng ngừa Hib bảo vệ chống bệnh nhiễm một loại vi trùng được gọi là *Trực khuẩn gây viêm màng não (Haemophilus influenzae)* hay Hib. Tuy có tên như thế, bệnh này không phải là cúm hay "flu". Thuốc chủng này được Health Canada (Bộ Y Tế Canada) phê chuẩn.

Thuốc chủng ngừa Hib được cung cấp miễn phí trong các loại chủng ngừa thông lệ cho con quý vị. Hãy gọi cho y tá sức khỏe cộng đồng địa phương hoặc bác sĩ để xin hẹn.

## Ai nên chủng ngừa Hib?

Trẻ em từ 2 đến 59 tháng (dưới 5 tuổi) nên chủng ngừa Hib. Thuốc này thường được kết hợp với các loại thuốc chủng khác như sởi uốn ván, bạch hầu, ho gà, viêm gan loại B và sốt tê liệt. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc [HealthLink BC File #105 Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sởi Uốn Ván, Ho Gà, Viêm Gan Loại B, Sốt Tê Liệt, và Trực Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b \(DTaP-HB-IPV-Hib\)](#).

Một số người trên 5 tuổi bị một số bệnh nào đó dễ bị nhiễm Hib. Một liều thuốc chủng này được cung cấp miễn phí cho những người:

- không có lách, hoặc lá lách không hoạt động đúng mức
- bệnh tế bào hình liềm
- hệ thống miễn nhiễm bị yếu đi vì bệnh hoặc điều trị y khoa
- ghép tế bào islet hoặc bộ phận cơ thể, hoặc ghép ốc tai (tai trong), hoặc đang chờ ghép
- đã được ghép tế bào chủ.

Điều quan trọng là lưu hồ sơ tất cả những lần chủng ngừa.

## Các Lợi Ích của Thuốc Chủng Ngừa Hib

Thuốc chủng ngừa Hib là cách hay nhất để bảo vệ con quý vị chống nhiễm trùng Hib, là căn bệnh nghiêm trọng và đôi khi làm thiệt mạng.

Khi quý vị cho con chủng ngừa là cũng giúp bảo vệ những người khác.

## Các Phản Ứng Có Thể Xảy Ra sau khi Chủng Ngừa

Các loại thuốc chủng rất an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với bị bệnh *Trực khuẩn gây viêm màng não loại b*.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng này có thể gồm sốt và đau nhức, sưng hoặc tấy đỏ tại chỗ tiêm chủng.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. KHÔNG nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA or Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Điều quan trọng là ở lại phòng chủng ngừa 15 phút sau khi chủng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng vì dị ứng như sốc đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chủng, hãy gọi số 911 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới một người trong mỗi một triệu người chủng ngừa.

**Hãy trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ.**

### **Ai không nên chủng ngừa Hib?**

Hãy cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ biết nếu con quý vị đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi chủng ngừa Hib trước đây, hoặc đối với bất cứ thành phần nào của thuốc chủng.

### **Trực khuẩn gây viêm màng não loại b (Hib) là gì?**

Nhiễm trùng Hib do một loại vi trùng có tên là *Trực khuẩn gây viêm màng não loại b* gây ra. Bệnh này thường ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ sơ sinh từ 6 đến 12 tháng dễ bị nhiễm trùng này hơn trước khi bắt đầu chủng ngừa bệnh này.

Hib có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng gồm viêm màng não, tức là nhiễm trùng màng não, và nhiễm khuẩn huyết, tức là máu bị nhiễm trùng. Cứ 20 trẻ bị bệnh thì có một sẽ bị thiệt mạng. Các biến chứng vĩnh viễn của bệnh này gồm hư não và điếc.

Vi trùng Hib cũng có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng trong cổ họng gọi là viêm nắp thanh quản. Trẻ bị nhiễm trùng này có thể thở rất khó khăn và có thể cần được giải phẫu cấp cứu để giúp thở được.

Nhiễm trùng Hib lan truyền khi ho, nhảy mũi, hoặc tiếp xúc trực diện. Bệnh này cũng có thể lan truyền qua nước miếng hoặc khạc nhổ khi hôn nhau hoặc dùng chung những thức ăn, muỗng nĩa và thức uống. Trẻ sơ sinh và trẻ em có thể bị lây bệnh khi dùng chung núm vú giả, bình bú hoặc đồ chơi với những trẻ khác.

Ngày nay hiếm xảy ra bệnh Hib tại BC nhờ các chương trình chủng ngừa trẻ thơ thông lệ.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File, hãy vào [www.healthlinkbc.ca/healthfiles/index.stm](http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/index.stm) hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào [www.healthlinkbc.ca](http://www.healthlinkbc.ca) hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control  
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY