



Thuốc Chủng Ngừa Sùi Uốn Ván và Bạch Hầu (Td) Tetanus and Diphtheria (Td) Vaccine

Chủng ngừa đã cứu được nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe

Thuốc chủng ngừa Td là gì?

Thuốc chủng ngừa Td bảo vệ chống hai căn bệnh:

- Sùi uốn ván
- Bạch hầu

Thuốc chủng này được Health Canada (Bộ Y Tế Canada) phê chuẩn và được cung cấp miễn phí. Hãy gọi cho y tá sức khỏe công cộng địa phương hoặc bác sĩ để xin hẹn.

Ở tuổi thơ, chủng ngừa sùi uốn ván và bạch hầu thường được kết hợp với các loại thuốc chủng khác như ho gà (ho rít) và sốt tê liệt. Những loại này được chủng theo một loạt nhiều liều hay tiêm chủng. Đa số trẻ được chủng những loại này lúc sơ sinh và trong tuổi chập chững và các em được chủng một liều tăng cường khi đi học và vào lớp 9.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc các HealthLink BC Files [#15a Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sùi Uốn Ván, Ho Gà, Sốt Tê Liệt \(DTaP-IPV\)](#), [#105 Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sùi Uốn Ván, Ho Gà, Viêm Gan Loại B, Sốt Tê Liệt, và Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b \(DTaP-HB-IPV-Hib\)](#), và [#18c Thuốc Chủng Ngừa Sùi Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà \(Tdap\)](#).

Ai nên chủng ngừa Td?

Thuốc chủng ngừa này được chủng cho người từ 7 tuổi trở lên.

Người lớn nên chủng ngừa Td 10 năm một lần nếu đã được chủng một loạt hồi nhỏ. Liều tăng cường này củng cố hoặc tăng cường hệ thống miễn nhiễm để bảo vệ hiệu quả hơn chống sùi uốn ván và bạch hầu.

Thuốc chủng này cũng có thể được chủng một loạt ba liều cho người lớn chưa miễn nhiễm hoặc không có hồ sơ đã chủng trước đó. Ngoài ra, thuốc chủng này cũng có thể được chủng cho những người bị đứt da nặng hoặc vết thương sâu mà lần cuối chủng ngừa sùi uốn ván đã cách đây từ 5 năm trở lên.

Điều quan trọng là lưu hồ sơ tất cả những lần chủng ngừa.

Các Lợi Ích của Thuốc Chủng Ngừa Td

Thuốc chủng ngừa Td là cách tốt nhất để bảo vệ chống sùi uốn ván và bạch hầu, là những căn bệnh nghiêm trọng và đôi khi làm thiệt mạng. Khi quý vị chủng ngừa là cũng giúp bảo vệ những người khác.

Các Phản Ứng Có Thể Xảy Ra sau khi Chủng Ngừa

Các loại thuốc chủng rất an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với bị bệnh sùi uốn ván hoặc bạch hầu.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng có thể gồm đau nhức, sưng hoặc tấy đỏ tại chỗ tiêm chủng.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. KHÔNG nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA or Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Điều quan trọng là ở lại phòng chùng ngừa 15 phút sau khi chùng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng vì dị ứng như sốc đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chùng, hãy gọi số 911 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới một người trong mỗi một triệu người chùng ngừa.

Hãy trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ.

Ai không nên chùng ngừa Td?

Hãy cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ biết nếu quý vị đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi chùng ngừa sài uốn ván hoặc bạch hầu trước đây, hoặc đối với bất cứ thành phần nào của thuốc chùng.

Những người bị Hội Chứng Guillain-Barré (GBS) trong vòng 8 tuần sau khi chùng ngừa sài uốn ván không nên chùng ngừa Td. GBS là một tình trạng có thể làm yếu và tê liệt các bắp thịt trong cơ thể nhưng hiếm khi xảy ra.

Sài Uốn Ván và Bạch Hầu là gì?

Sài uốn ván, còn được gọi là “khóa hàm”, do một loại vi trùng thường có trong đất gây ra. Khi vi trùng này xâm nhập cơ thể qua một vết đứt da hoặc trầy trụa, vi trùng này sản xuất một chất độc có thể làm co thắt bắp thịt khắp cơ thể thật đau đớn. Bệnh này rất nghiêm trọng nếu các bắp thịt hô hấp bị ảnh hưởng. Có đến 2 trong 10 người bị sài uốn ván sẽ thiệt mạng.

Bạch hầu là một chứng nhiễm trùng nghiêm trọng mũi và cổ họng. Vi trùng này lan truyền qua không khí khi nhảy mũi hoặc ho

và khi tiếp xúc da trực tiếp với nhau. Bệnh này có thể đưa đến các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. Bệnh này cũng có thể làm đứng tim và tê liệt. Khoảng 1 trong 10 người bị bệnh bạch hầu sẽ thiệt mạng.

Ngày nay hiếm xảy ra các bệnh này tại BC nhờ các chương trình chùng ngừa trẻ thơ thông lệ.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File, hãy vào www.healthlinkbc.ca/healthfiles/index.stm hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.healthlinkbc.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY