



Thuốc Chủng Ngừa Sùi Uốn Ván, Bạch Hầu và Sốt Tê Liệt (Td-IPV)

Tetanus, Diphtheria and Polio (Td-IPV) Vaccine

**Giữ an toàn cho con quý vị.
Chủng ngừa đầy đủ đúng thời hạn.**

Khi chủng ngừa đầy đủ đúng thời hạn, con quý vị có thể được bảo vệ chống nhiều căn bệnh suốt đời.

Chủng ngừa đã cứu được nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe

Thuốc chủng ngừa Td-IPV là gì?

Thuốc chủng ngừa Td-IPV bảo vệ chống ba căn bệnh:

- Sùi uốn ván
- Bạch hầu
- Sốt tê liệt

Thuốc chủng này được Bộ Y Tế Canada phê chuẩn và được cung cấp miễn phí. Hãy gọi cho y tá sức khỏe công cộng địa phương hoặc bác sĩ để xin hẹn.

Ai nên chủng ngừa Td-IPV?

Thuốc chủng ngừa Td-IPV được chủng cho người từ 7 tuổi trở lên và cần một liều tăng cường chống sùi uốn ván và bạch hầu và cũng cần được bảo vệ chống sốt tê liệt vì các tình huống đặc biệt.

Điều quan trọng là lưu hồ sơ tất cả những lần chủng ngừa.

Các Lợi Ích của Thuốc Chủng Ngừa Td-IPV

Thuốc chủng ngừa Td-IPV là cách hay nhất để bảo vệ chống sùi uốn ván, bạch hầu, và sốt tê liệt, là những căn bệnh nghiêm trọng và đôi khi làm thiệt mạng.

Khi quý vị chủng ngừa là cũng giúp bảo vệ những người khác.

Các Phản Ứng Có Thể Xảy Ra sau khi Chủng Ngừa

Các loại thuốc chủng rất an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với bị bệnh sùi uốn ván, bạch hầu hoặc sốt tê liệt.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng có thể gồm đau nhức, sưng hoặc tấy đỏ tại chỗ tiêm chủng.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. KHÔNG nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA or Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Điều quan trọng là ở lại phòng chủng ngừa 15 phút sau khi chủng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng vì dị ứng như sốc đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chủng, hãy gọi số 911 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới một người trong mỗi một triệu người chủng ngừa.

Hãy trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ.

Ai không nên chủng ngừa Td-IPV?

Hãy cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ biết nếu quý vị hoặc con quý vị đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi chủng ngừa sởi uốn ván, bạch hầu, hoặc sốt tê liệt trước đây, hoặc đối với bất cứ thành phần nào của thuốc chủng, gồm cả neomycin hoặc polymyxin B.

Không chủng loại thuốc này cho trẻ em dưới 7 tuổi vì nên chủng các loại thuốc chủng khác.

Những người bị Hội Chứng Guillain-Barré (GBS) trong vòng 8 tuần sau khi chủng ngừa sởi uốn ván không nên chủng ngừa Td-IPV. GBS là một tình trạng có thể làm yếu và tê liệt các bắp thịt trong cơ thể nhưng hiếm khi xảy ra.

Sởi Uốn Ván, Bạch Hầu, và Sốt Tê Liệt là gì?

Sởi uốn ván, còn được gọi là “khóa hàm”, do một loại vi trùng thường có trong đất gây ra. Khi vi trùng này xâm nhập cơ thể qua một vết đứt da hoặc trầy trụa, vi trùng này sản xuất một chất độc có thể làm co thắt bắp thịt khắp cơ thể thật đau đớn. Bệnh này rất nghiêm trọng nếu các bắp thịt hô hấp bị ảnh hưởng. Có đến 2 trong 10 người bị sởi uốn ván sẽ thiệt mạng.

Bạch hầu là một chứng nhiễm trùng nghiêm trọng mũi và cổ họng. Khoảng 1 trong 10 người bị bạch hầu sẽ thiệt mạng. Vi trùng này lan truyền qua không khí khi nháy mũi hoặc ho và khi tiếp xúc da trực tiếp với nhau. Bệnh này có thể đưa đến các vấn đề hô hấp nặng. Bệnh này cũng có thể làm đứng tim và tê liệt.

Sốt tê liệt là một căn bệnh do một loại siêu vi khuẩn gây ra. Tuy một số trường hợp bị nhiễm sốt tê liệt không có triệu chứng, những trường

hợp khác có thể gây tê liệt cánh tay hoặc chân và ngay cả làm thiệt mạng. Sốt tê liệt có thể lan truyền khi tiếp xúc với phân của người bị nhiễm trùng. Trường hợp này có thể xảy ra khi ăn thức ăn hoặc uống nước bị ô nhiễm phân.

Ngày nay hiếm xảy ra các bệnh này tại BC nhờ các chương trình chủng ngừa trẻ thơ thông lệ.

Ứng Thuận của Vị Thành Niên Chính Chẩn

Sẽ có nỗ lực xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ ưng thuận trước khi chủng ngừa. Trẻ em dưới 19 tuổi hiểu được các rủi ro và lợi ích có thể ưng thuận hoặc từ chối chủng ngừa, bất luận ý muốn của cha mẹ hoặc người giám hộ như thế nào. Cha mẹ/người giám hộ và các con vị thành niên nên thảo luận về chủng ngừa trước, và hỏi y tá hoặc bác sĩ nếu có bất cứ thắc mắc nào.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY