



Thuốc Chủng Ngừa Sùi Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà Tetanus, Diphtheria, Pertussis Vaccine

Thuốc chủng ngừa là cách hay nhất để bảo vệ mọi người chống lại nhiều căn bệnh và các biến chứng của bệnh. Khi quý vị chủng ngừa là quý vị cũng giúp bảo vệ người khác.

Thuốc chủng ngừa sùi uốn ván, bạch hầu, ho gà (Tdap) được đề nghị chủng cho tất cả học sinh lớp 9. Liều thuốc chủng này tăng cường hệ thống miễn nhiễm để chống lại sùi uốn ván, bạch hầu và ho gà cho trẻ nào đã được chủng ngừa trước đó.

Thuốc chủng ngừa Tdap cũng có thể được chủng cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên mà chưa miễn nhiễm hoàn toàn, và cho người lớn hoặc di dân chưa miễn nhiễm.

Thuốc chủng ngừa Tdap là gì?

Thuốc chủng ngừa Tdap bảo vệ chống 3 căn bệnh:

- Sùi uốn ván
- Bạch hầu
- Ho gà

Sùi uốn ván là gì?

Sùi uốn ván, còn được gọi là “khóa hàm”, là do một loại vi trùng phần lớn có trong đất gây ra. Khi vi trùng này xâm nhập cơ thể qua vết đứt da hoặc trầy trụa, vi trùng này tiết ra một chất độc có thể làm co thắt bắp thịt khắp cơ thể thật đau đớn. Bệnh này rất nghiêm trọng nếu các bắp thịt hô hấp bị ảnh hưởng. Có đến 2 trong 10 người bị sùi uốn ván sẽ thiệt mạng.

Bạch hầu là gì?

Bạch hầu là một chứng nhiễm trùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến mũi và cổ họng. Khoảng 1 trong 10 người bị bạch hầu sẽ bị thiệt mạng. Vi trùng này lan truyền qua không khí khi nhảy mũi hoặc ho và khi da tiếp xúc trực tiếp với nhau. Bệnh này có thể đưa đến các vấn đề hô hấp

nặng. Bệnh này cũng có thể làm đứng tim và gây tê liệt.

Ho gà là gì?

Ho gà, hay “ho rít”, là một chứng nhiễm trùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến phổi và cổ họng. Mỗi năm tại Canada có khoảng 1 đến 3 người bị thiệt mạng vì ho gà. Vi trùng này có thể lây dễ dàng khi ho, nhảy mũi hoặc tiếp xúc trực diện.

Ho gà có thể làm cho ho dữ dội và thường dứt bằng tiếng kêu rít trước hơi thở kè. Tình trạng ho này có thể kéo dài nhiều tháng và thường xảy ra vào ban đêm nhiều hơn. Ho gà cũng có thể làm sưng phổi, co giật bắp thịt, hư não hoặc thiệt mạng. Các biến chứng nghiêm trọng này thường thấy nhất ở em bé; tuy nhiên trẻ lớn hơn và người lớn bị ho gà thường lây sang em bé còn quá nhỏ nên không được thuốc chủng ngừa bảo vệ trọn vẹn.

Các phản ứng có thể xảy ra sau khi chủng ngừa Tdap

Các phản ứng thông thường có thể gồm đau nhức, tấy đỏ và sưng cánh tay ở chỗ chích. Cũng có thể bị nhức đầu và sốt nhẹ.

Đối với bất cứ thuốc chủng nào cũng đều có thể xảy ra một phản ứng như bị điện giật đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi, môi hoặc mắt. Gọi số 9-1-1 hoặc số khẩn cấp địa phương quý vị nếu xảy ra các phản ứng này. Các phản ứng này có thể điều trị được và xảy ra cho chưa tới một người trong một triệu người chủng ngừa. Điều quan trọng là ở lại phòng chủng ngừa 15 phút sau khi chủng bất cứ loại thuốc gì vì đây là lúc phản ứng như điện giật thường xảy ra.

Hãy trình báo tất cả các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho y tá sức khỏe cộng đồng hoặc bác sĩ.

Có thể cho uống **Acetaminophen hoặc Tylenol®** nếu bị sốt hoặc đau nhức. **KHÔNG** nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA hoặc Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Ai không nên chủng ngừa Tdap?

Không nên chủng ngừa cho những người sau đây:

- Đã từng bị phản ứng đe dọa đến mạng sống vì dị ứng với liều thuốc chủng ngừa sởi uốn ván, bạch hầu, hoặc ho gà trước đây, hoặc với bất cứ thành phần nào của các loại thuốc chủng này.
- Đã bị Hội Chứng Guillain-Barré (GBS) trong vòng 8 tuần sau khi chủng ngừa sởi uốn ván. GBS là một tình trạng có thể làm yếu và tê liệt các bắp thịt trong cơ thể. Hội chứng này thường xảy ra sau khi bị nhiễm trùng, nhưng cũng có thể xảy ra sau khi chủng một số loại thuốc chủng nào đó tuy hiếm khi xảy ra.

Nếu quý vị lo ngại là mình không nên chủng ngừa thuốc này, hãy nói chuyện với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Ứng Thuận của Vị Thành Niên Chính Chấn

Cha mẹ hoặc người giám hộ và các con nên nói chuyện với nhau về vấn đề ứng thuận chủng ngừa. Sẽ có nỗ lực xin phép cha mẹ/người giám hộ hoặc người đại diện ứng thuận trước khi chủng ngừa. Tuy nhiên, luật cho phép trẻ em dưới 19 tuổi hiểu được các lợi ích và phản ứng có thể xảy ra của mỗi loại thuốc chủng và rủi ro khi không chủng ngừa thì có thể ứng thuận hoặc từ chối chủng ngừa.

Muốn biết thêm chi tiết

Immunize BC: www.immunizebc.ca

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY