

Globulin Miễn Nhiễm Viêm Gan Loại B Hepatitis B Immune Globulin

Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B là gì?

Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B bảo vệ ngay tức thời, ngăn hạn để chống nhiễm viêm gan loại B. Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B có nhiều kháng thể viêm gan loại B rút từ máu người hiến tặng. Kháng thể là các chất đậm do hệ thống miễn nhiễm của một người tạo ra để kháng trùng, chẳng hạn như vi trùng hoặc siêu vi khuẩn như viêm gan loại B.

Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B được Bộ Y Tế Canada phê chuẩn.

Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B có an toàn hay không?

Có. Dịch Vụ Máu Canada dò tìm và thử nghiệm mỗi vụ hiến máu. Kể từ khi bắt đầu dò tìm và thử nghiệm máu, không thấy có phức tạp về những trường hợp nhiễm trùng trong máu như HIV hoặc viêm gan loại B ở những người được tiêm globulin miễn nhiễm viêm gan loại B.

Ai nên dùng globulin miễn nhiễm viêm gan loại B?

Nếu quý vị đã tiếp xúc với siêu vi khuẩn viêm gan loại B, và chưa được chủng ngừa viêm gan loại B trước đây, quý vị có thể nên tiêm 1 liều globulin miễn nhiễm viêm gan loại B.

Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B có hiệu quả nhất khi được tiêm càng sớm càng tốt và trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với siêu vi khuẩn viêm gan loại B.

Nên dùng globulin miễn nhiễm viêm gan loại B cho những người sau đây:

- Những người tiếp xúc với máu được biết hoặc nghi là nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B vì:
 - bị đâm vào da bằng kim đã dùng rồi
 - bị văng máu ô nhiễm vào miệng, mũi, hoặc mắt
 - bị người nhiễm bệnh viêm gan loại B cắn, hoặc
 - tiếp xúc với các vật dụng trong nhà như bàn chải đánh răng, chỉ chà kê răng hoặc dao cạo dính máu của người bị nhiễm bệnh này.
- Những người có sinh hoạt tình dục với người bị bệnh viêm gan loại B
- Nạn nhân bị cưỡng hiếp tình dục
- Trẻ sơ sinh và trẻ dưới 12 tháng có mẹ bị viêm gan loại B
- Trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiều rủi ro nhiễm viêm gan loại B, chẳng hạn như người tiêm ma túy qua tĩnh mạch hoặc làm nghề mại dâm.

Có thể chủng một liều thuốc ngừa viêm gan loại B cùng lúc tiêm globulin miễn nhiễm viêm gan loại B. Sau đó sẽ chủng thêm hai liều thuốc ngừa viêm gan loại B để bảo vệ đầy đủ, dài hạn chống bệnh này. Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe để biết khi nào chủng những liều này. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc HealthLink BC File [#25a Thuốc Chủng Ngừa Viêm Gan Loại B](#).

Các lợi ích của globulin miễn nhiễm viêm gan loại B là gì?

Globulin miễn nhiễm viêm gan loại B giúp bảo vệ ngay, ngăn hạn chống nhiễm trùng viêm gan loại B. Loại này có thể ngừa bệnh này hoặc giúp cho bệnh bớt nặng.

Các phản ứng nào có thể xảy ra sau khi tiêm Globulin miễn nhiễm?

Các phản ứng thông thường với globulin miễn nhiễm viêm gan loại B có thể gồm đau nhức và ngứa tại chỗ tiêm. Cũng có thể bị sốt nhẹ hoặc khó chịu trong người.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. KHÔNG nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA hoặc Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Điều quan trọng là ở lại phòng chủng ngừa 15 phút sau khi chủng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng dị ứng như sốc đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chủng, hãy gọi số 9-1-1 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới một người trong mỗi một triệu người chủng ngừa.

Điều quan trọng là luôn luôn trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Ai không nên dùng globulin miễn nhiễm viêm gan loại B?

Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị:

- đã được chủng ngừa sởi, quai bị, ban đào (MMR) hoặc thủy đậu trong vòng 14 ngày qua.
- đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi tiêm globulin miễn nhiễm trước đây, hoặc đối với bất cứ thành phần nào trong đó, hoặc với latex.

Viêm gan loại B là gì?

Viêm gan loại B là loại siêu vi khuẩn tấn công gan. Siêu vi khuẩn này có thể gây bệnh nặng gồm cả hư gan vĩnh viễn, còn gọi là xơ gan. Viêm gan loại B cũng là nguyên nhân chính gây ung thư gan, khiến có thể thiệt mạng. Siêu vi khuẩn viêm gan loại B lan truyền từ người bị nhiễm sang người khác khi tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể. Sau khi siêu vi khuẩn

này xâm nhập cơ thể, thông thường sẽ mất từ 2 đến 3 tháng mới có các triệu chứng hoặc dấu hiệu bị bệnh. Nhiều người bị viêm gan loại B mà không có triệu chứng và có thể không biết họ bị bệnh này. Dù có dấu hiệu bị bệnh hay không, quý vị vẫn có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác.

Ứng thuận của vị thành niên chín chắn

Cha mẹ hoặc người giám hộ và các con nên nói chuyện với nhau về vấn đề ứng thuận chủng ngừa. Sẽ có nỗ lực xin phép cha mẹ/người giám hộ hoặc người đại diện ứng thuận trước khi chủng ngừa. Tuy nhiên, luật cho phép trẻ em dưới 19 tuổi hiểu được các lợi ích và phản ứng có thể xảy ra của mỗi loại thuốc chủng và rủi ro khi không chủng ngừa thì có thể ứng thuận hoặc từ chối chủng ngừa.

Muốn biết thêm chi tiết về chủng ngừa, hãy đến Immunize BC tại www.immunizebc.ca.

Muốn biết thêm các đề tài của BC HealthFile vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.healthlinkbc.ca hoặc gọi số 8-1-1 để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY