



Thuốc Chủng Ngừa Phế Cầu Khuẩn Polysaccharide Pneumococcal Polysaccharide Vaccine

Chủng ngừa đã cứu nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn so với bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe.

Thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn polysaccharide là gì?

Thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn polysaccharide bảo vệ chống lại 23 loại phế cầu khuẩn. Thuốc chủng này được Bộ Y Tế Canada (Health Canada) phê chuẩn.

Thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn polysaccharide không thuộc những loại chủng ngừa thông lệ cho tuổi thơ. Muốn biết chi tiết về thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn thông lệ cho tuổi thơ, hãy đọc HealthLink BC File [#62a Thuốc Chủng Ngừa Phế Cầu Khuẩn Kết Hợp \(PCV 13\)](#).

Ai nên chủng thuốc này?

Một số người dễ bị rủi ro bị bệnh vì nhiễm phế cầu khuẩn. Thuốc chủng này được cung cấp miễn phí cho những người sau đây, gồm:

- người cao niên từ 65 tuổi trở lên; và
- cư dân thuộc bất cứ tuổi nào sống trong viện chăm sóc nội trú, sinh sống có trợ giúp hoặc trong các cơ sở tập thể khác.

Thuốc chủng này cũng được cung cấp miễn phí cho những người từ 2 tuổi trở lên và bị các bệnh hoặc tình trạng nào đó. Những người bị các tình trạng sau đây nên chủng một liều thuốc này:

- không có lá lách, hoặc lá lách không hoạt động đúng mức*
- bệnh tế bào hình liềm*
- hệ thống miễn nhiễm bị yếu đi vì bệnh hoặc điều trị y khoa*

- bệnh gan kinh niên, gồm cả xơ gan, viêm gan loại B hoặc viêm gan loại C kinh niên*
- bệnh thận kinh niên*
- bệnh tim hoặc phổi kinh niên
- ghép tế bào islet hoặc bộ phận cơ thể, hoặc ghép ốc tai (tai trong), hoặc đang chờ ghép
- đã được ghép tế bào chủ
- bị tiểu đường, xơ nang hoặc ri dịch não cột sống kinh niên
- nghiện rượu
- những người vô gia cư
- người sử dụng ma túy

*Người trong những nhóm này nên chủng liều thứ nhì vài năm sau liều thứ nhất. Hãy hỏi y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ khi nào thì chủng liều thứ nhì.

Điều quan trọng là lưu hồ sơ tất cả những lần chủng ngừa.

Các Lợi Ích của Thuốc Chủng

Thuốc chủng ngừa là cách hay nhất để bảo vệ chống bệnh phế cầu khuẩn, một căn bệnh nghiêm trọng và đôi khi làm thiệt mạng.

Khi quý vị chủng ngừa là cũng giúp bảo vệ những người khác.

Các Phản Ứng Có Thể Xảy Ra sau khi Chủng Ngừa

Các loại thuốc chủng rất an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với bị bệnh phế cầu khuẩn.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng có thể gồm đau nhức, tấy đỏ và sưng tại chỗ tiêm chủng. Cũng có thể bị nhức đầu và sốt

nhẹ. Các phản ứng này đều nhẹ và nói chung kéo dài từ 1 đến 2 ngày.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. KHÔNG nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA hoặc Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Điều quan trọng là ở lại phòng chủng ngừa 15 phút sau khi chủng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng vì dị ứng như sốc phản vệ đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chủng, hãy gọi số 911 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới một người trong mỗi một triệu người chủng ngừa.

Hãy trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ.

Ai không nên chủng thuốc này?

Hãy cho nơi chủng ngừa cho quý vị (y tá, bác sĩ, hoặc dược sĩ) biết nếu quý vị đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi chủng ngừa phế cầu khuẩn trước đây, hoặc đối với bất cứ thành phần nào của thuốc chủng.

Trẻ em dưới 2 tuổi không nên chủng ngừa phế cầu khuẩn polysaccharide vì thuốc chủng này không có hiệu quả ở trẻ nhỏ. Thay vào đó, các trẻ này được chủng ngừa phế cầu khuẩn kết hợp, bắt đầu từ 2 tháng sau khi sinh.

Bệnh phế cầu khuẩn là gì?

Bệnh phế cầu khuẩn do một loại vi trùng gây ra. Vi trùng này có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng và đe dọa đến mạng sống như nhiễm trùng:

- phổi (sưng phổi),
- máu (nhiễm khuẩn huyết), và
- màng não (viêm màng não).

Cứ 4 người bị bệnh thì 1 người có thể thiệt mạng. Các biến chứng vĩnh viễn của bệnh nào gồm hư não và điếc.

Bệnh phế cầu khuẩn lan truyền từ người này sang người khác khi ho, nhảy mũi hoặc tiếp xúc trực tiếp đối mặt. Vi trùng này cũng có thể lan truyền qua nước miếng (nước bọt) hoặc khạc nhổ. Trường hợp này có thể xảy ra qua các sinh hoạt như hôn nhau, hoặc dùng chung thức ăn, thức uống, thuốc lá, son môi, chai nước, miếng che miệng khi chơi thể thao hoặc những miếng ngậm nhạc khí.

Ứng Thuận của Vị Thành Niên Chính Chẩn

Cha mẹ hoặc người giám hộ và các con nên nói chuyện với nhau về vấn đề ứng thuận chủng ngừa. Sẽ có nỗ lực xin phép cha mẹ/người giám hộ hoặc người đại diện ứng thuận trước khi chủng ngừa. Tuy nhiên, luật cho phép trẻ em dưới 19 tuổi hiểu được các lợi ích và phản ứng có thể xảy ra của mỗi loại thuốc chủng và rủi ro khi không chủng ngừa thì có thể ứng thuận hoặc từ chối chủng ngừa.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLink BC File vào

www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/index.stm

hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY