



## 梅毒 Syphilis

### 梅毒是甚麼？

梅毒是一種由細菌引起的感染。感染分為 4 個階段：初期、第二期、早期潛伏期和晚期潛伏期。

### 怎樣會感染梅毒？

當您與感染人士密切接觸或發生性接觸時，您就會感染梅毒。梅毒的傳播方式有：

- 皮膚接觸到感染者身上的梅毒潰瘍（破損處）、疹子、由外部或內部接觸到他人帶有潰瘍或疹子的口腔、生殖器或直腸
- 體液交換，如血液、精液或陰道分泌物
- 共用性玩具
- 您在懷孕或分娩期間可以把感染傳染給您的寶寶，這被稱為先天性梅毒

任何人都會感染梅毒，但卑詩省大部分確診的梅毒患者都是男性，且為同性戀、雙性戀或有男男性行為（gbMSM）。不過，近日順性別女性患有梅毒並導致先天性梅毒的概率大幅增加。

梅毒可在 4 個感染階段中的任一階段發生傳播。患有其他種類性傳播疾病（STI）的人士感染梅毒的機率會更高。

### 感染後有何症狀？

每一階段的梅毒都有不同的症狀，它們因人而異，又或很輕微，以致患者無法察覺自己已受感染。

### 初期

在梅毒初期，您的身體與感染者接觸過的部位會長出無痛的潰瘍。潰瘍一般在感染後的 3-90 天內出現。有時潰瘍並不明顯。幾週內，潰瘍會自行消失，但是疾病仍會繼續發展。

### 第二期

第二期一般在感染後約 14-90 天內開始。在這階段可能會出現不癢的疹子。疹子可以在任何部位出現，但一般均在胸部、腹部、生殖器、手掌及腳底。您可能不會注意到這些疹子，但您仍可傳染他人。疹子通常會消失，但數月後又會復發。其他症狀包括：頭痛、發燒、脫髮、淋巴結腫脹，口腔、肛門、陰莖或陰道內出現硬塊或粘膜斑塊。

### 潛伏期

疹子消退後，如您沒有獲得治療，梅毒會發展至潛伏期。這段期間可能長達 30 年以上。您可能在此期間的一段時間內無任何症狀。

梅毒有兩種潛伏期：

- 患者如在過去一年內受到梅毒感染，即處於早期潛伏期。處於這階段的患者更容易傳染他人
- 患者如在感染梅毒的時間超過一年，即處於晚期潛伏期。

## 怎樣進行梅毒測試

請聯絡您的醫護人員，安排對任何梅毒症狀（如潰瘍或疹子）進行檢測。醫護人士可能會轉介您至化驗機構接受血液檢測。

我們建議 gbMSM 人群或有多個性伴侶的人士每 3 到 6 個月接受梅毒檢測，或者在出現症狀後立即進行檢測。

建議任何懷孕人士定期進行梅毒篩查，作為孕前篩檢的一部份，並在分娩前多做一次。如果您已懷孕，請向醫護人員諮詢有關風險因素，以確定進行包括梅毒在內的 STI 篩查的必要性。

要找尋卑詩省內距您最近的檢測診所或透過網上接受測試，請瀏覽 Smart Sex Resource，網站是 <https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it>，以及 / 或者 Get Checked Online，網址：<https://getcheckedonline.com>。

## 梅毒有哪些併發症？

如未接受治療，梅毒患者在感染初期或幾年後可能出現併發症。併發症可能表現在神經性方面（例如失聰或失明，或感到暈眩），抑或腦部、心臟及身體其他器官受損，繼而可能導致死亡。

未接受梅毒治療的妊娠可能出現嚴重併發症包括流產、早產或死胎，嬰兒出生體重過低，或胎兒出生後即患有梅毒。

## 如何治療？

任何階段的梅毒都可以用抗生素治療。抗生素治療不能逆轉梅毒在晚期潛伏期造成的損害，但能阻止病毒進一步損害身體。接受治療後，您必須進行驗血以確定治療已發揮功效。

過去 3-12 個月內與您發生過性關係的伴侶也需進行梅毒檢測和治療，具體取決於您確診的梅毒處在哪個階段。不要發生性行為，直至您和性伴侶完成治療後 2 周並確認治療已生效為止。

## 如果服用抗生素，避孕藥還起作用嗎？

鮮有證據顯示抗生素會降低激素類避孕手段的效力。激素類避孕手段包括藥片、避孕貼、節育環或避孕針。如果您正在接受抗生素治療，請繼續遵循您的避孕方式。如果您有任何疑慮，可在抗生素治療結束後一直使用避孕套，直至下一次月經來潮為止，也可以諮詢您的醫護人員瞭解更多資訊。

## 更多資訊

如需瞭解有關降低罹患 STI 機率的更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #080 預防性傳播感染 \(STI\)](#)



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority