



La syphilis

Syphilis

Qu'est-ce que la syphilis?

La syphilis est une infection bactérienne qui est transmise par le contact avec les muqueuses d'une personne infectée. L'infection comporte quatre stades : primaire, secondaire, latent précoce et latent tardif.

Comment contracte-t-on la syphilis?

Elle peut être transmise par contact corporel ou par l'échange de fluides corporels avec une personne qui présente une plaie (lésion) ou une éruption de syphilis infectieuse à la surface de la peau. Cela peut arriver à l'occasion d'un contact étroit ou sexuel avec la bouche d'une personne, ses organes génitaux ou son rectum qui arborent une plaie ou une éruption. La syphilis peut également être transmise à un bébé par sa mère au cours de la grossesse ou à la naissance.

Tant les hommes que les femmes peuvent contracter la syphilis, la grande majorité des personnes chez qui l'on a diagnostiqué la syphilis en Colombie-Britannique sont des hommes qui se définissent comme gais, bisexuels ou des hommes qui ont des relations homosexuelles. Les taux de syphilis ont augmenté considérablement en ce qui concerne les hommes qui ont des relations homosexuelles, surtout parmi ceux qui ont de 20 à 24 ans.

Si vous êtes atteint d'une autre infection transmissible sexuellement (ITS), votre risque de contracter la syphilis est plus élevé.

Quels en sont les symptômes?

Chaque stade de la syphilis comporte une série distincte de symptômes. Les symptômes peuvent être si légers ou varier, tant et si bien qu'il se peut que vous ignoriez même souffrir de la syphilis.

Pour savoir si vous avez la syphilis, vous devez être examiné par un professionnel de santé, faire faire un prélèvement de sang et des analyses de vos éruptions ou plaies en laboratoire.

Stade primaire

Au cours de l'étape primaire, une plaie indolore peut apparaître à n'importe endroit de votre corps qui est entré en contact avec une personne atteinte de syphilis. Elle apparaît ordinairement environ trois semaines après le premier contact, mais elle peut apparaître entre 3 et 90 jours après l'infection. Parfois, la plaie ne sera pas visible. Elle disparaîtra d'elle-même après quelques semaines, mais la maladie continuera son œuvre.

Stade secondaire

Le stade secondaire se déclare habituellement environ 2 à 12 semaines après avoir été infecté, mais il peut débuter de 2 semaines à 6 mois après. Au cours de ce stade, une éruption non prurigineuse peut apparaître. L'éruption peut apparaître n'importe où sur le corps, mais on la retrouve le plus souvent sur la poitrine, le ventre, les organes génitaux, la paume des mains et la plante des pieds. Vous pouvez ne pas remarquer l'éruption, mais vous pouvez quand même contribuer à propager la maladie. L'éruption disparaît habituellement, mais elle peut resurgir quelques mois plus tard. D'autres symptômes peuvent comprendre des maux de tête, de la fièvre, la perte de cheveux, la présence de ganglions enflés et des bosses ou des plaques muqueuses dans la bouche, sur l'anus, sur le pénis ou dans le vagin.

Stades latents

Une fois l'éruption disparue, si la maladie n'a pas été traitée, elle progressera aux stades de latence, ou stades cachés, de la syphilis. Vous pourriez ne pas présenter de symptômes pendant quelque temps. La période de latence peut durer jusqu'à 30 ans.

- Stade latent précoce : la personne a contracté la syphilis au cours de l'année. Les personnes à ce stade « précoce » peuvent plus facilement propager l'infection à leurs partenaires sexuels
- Stade latent tardif : lorsqu'une personne est atteinte de syphilis depuis plus d'un an. Si vous

ne vous faites pas traiter, vous pourriez continuer à souffrir de syphilis sans aucun signe ni symptôme évident

Comment vous faire tester pour la syphilis

Consultez votre fournisseur de soins de santé afin d'obtenir une recommandation pour une prise de sang et des analyses de laboratoire de vos plaies.

Il est recommandé aux hommes qui ont des relations homosexuelles de subir des tests pour la syphilis tous les trois à six mois, ou immédiatement si vous présentez des symptômes, comme une plaie ou une éruption.

Il est recommandé aux femmes enceintes de se faire tester pour la syphilis dans le cadre d'un dépistage prénatal. Si vous êtes enceinte, discutez avec votre fournisseur de soins des facteurs de risque pour les ITS pendant votre grossesse afin de déterminer si vous avez besoin d'un test de dépistage, y compris pour la syphilis.

Vous pouvez obtenir un test de dépistage en vous adressant directement à certains laboratoires en Colombie-Britannique. Afin de trouver la clinique de dépistage la plus proche ou d'obtenir un test en ligne, consultez Smart Sex Resource à <https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it> (en anglais seulement) ou Get Checked Online à www.getcheckedonline.com (en anglais seulement).

Quelles sont les complications possibles?

Si vous ne recevez aucun traitement contre la syphilis, des complications peuvent survenir tôt après l'infection ou des années plus tard. Les complications peuvent être d'ordre neurologique (comme une perte de la vision ou de l'audition, ou des étourdissements) ou physique, comme des dommages au cerveau, au cœur et à d'autres organes qui peuvent être mortels.

La syphilis non traitée chez une femme enceinte peut causer des complications au bébé, comme une fausse couche, une naissance prématurée ou

celle d'un mort-né, un faible poids à la naissance ou une syphilis congénitale (bébé né avec la syphilis).

Quel en est le traitement?

À n'importe quel stade de la maladie, la syphilis peut être traitée avec des antibiotiques. Le traitement antibiotique ne peut pas éliminer les dommages produits par la maladie au stade latent tardif, mais il peut en prévenir d'autres. Votre formule sanguine selon des analyses devra confirmer le succès du traitement, une fois terminé.

Tous vos partenaires devront être examinés, testés et, en cas d'infection, ils devront être traités pour la syphilis. Il est recommandé de ne pas avoir de relations sexuelles deux semaines après la fin de votre traitement et de celui de votre partenaire, et tant que la réussite du traitement ne sera pas confirmée.

La pilule contraceptive est-elle efficace en cas de prise d'antibiotiques?

Il y a très peu de données probantes qui démontrent que la prise d'antibiotiques réduit l'efficacité de la contraception hormonale, notamment la pilule contraceptive, le timbre contraceptif, l'anneau vaginal et l'injection contraceptive. Si vous êtes actuellement sous traitement avec antibiotiques, il est important de continuer à utiliser votre moyen de contraception comme vous le feriez normalement. Si vous avez des préoccupations, utilisez également des condoms jusqu'à vos prochaines règles après le traitement antibiotique ou adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé.

Pour de plus amples renseignements

Pour plus d'information sur la façon de réduire votre risque de contracter une ITS, consultez [HealthLinkBC File n° 08o La prévention des infections transmissibles sexuellement \(ITS\)](#).



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.