



# Réalités sur l'influenza (la grippe)

## Facts about Influenza (the Flu)

### Qu'est-ce que la grippe?

La grippe, parfois appelée influenza, est une infection aiguë des voies respiratoires supérieures causée par le virus de l'influenza A ou B.

Avoir la grippe vous rend également susceptible de contracter d'autres infections. Ce qui comprend la pneumonie virale ou bactérienne qui s'attaque aux poumons. Les risques de complications à la suite de la grippe peuvent être mortelles. Les personnes les plus à risque sont les aînés de 65 ans ou plus, les très jeunes enfants, les personnes qui souffrent de maladies pulmonaires, cardiaques, ou de certaines maladies chroniques, ou celles dont le système immunitaire est affaibli.

Les femmes en bonne santé qui en sont à la seconde moitié de leur grossesse courent un risque plus élevé d'hospitalisation lorsqu'elles contractent le virus de la grippe.

Au Canada, des milliers de personnes sont hospitalisées et peuvent mourir de la grippe et de ses complications pendant les années où l'activité grippale est généralisée ou très répandue.

### Comment peut-on prévenir la grippe?

Vous pouvez réduire le risque de contracter la grippe ou de la transmettre aux autres en prenant les précautions suivantes :

- Vous laver les mains régulièrement
- Nettoyer et désinfecter les objets et surfaces que de nombreuses personnes touchent
- Jeter rapidement les mouchoirs de papier dans une corbeille à papier ou une poubelle
- Tousser et éternuer dans votre manche plutôt que dans vos mains
- Rester à la maison quand vous êtes malade
- Vous faire vacciner contre la grippe

Vous faire vacciner contre la grippe peut contribuer à éviter d'avoir la grippe et de la transmettre à d'autres personnes.

### Comment la grippe se propage-t-elle?

La grippe se propage facilement d'une personne à l'autre par la toux, les éternuements ou les contacts rapprochés du visage.

Le virus peut aussi se transmettre lorsqu'une personne touche aux gouttelettes résultant de la toux et des éternuements se trouvant sur une autre personne ou un objet, et qu'elle se touche ensuite les yeux, la bouche ou le nez sans s'être lavé les mains.

Une personne infectée peut transmettre le virus grippal même avant de se sentir malade. Un adulte peut transmettre le virus environ un jour avant le début des symptômes et jusqu'à cinq jours après leur apparition. Les jeunes enfants peuvent propager le virus plus longtemps.

### Quels sont les symptômes?

Les symptômes de la grippe peuvent comprendre la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des écoulements nasaux, des maux de gorge, une fatigue extrême et de la toux. Les enfants peuvent avoir de la nausée, de la diarrhée ou vomir. Même si des infections à d'autres virus peuvent provoquer des symptômes semblables, ceux du virus grippal ont tendance à être plus graves.

Les symptômes peuvent se déclarer chez une personne un à quatre jours, ou en moyenne deux jours, après sa première exposition au virus grippal. Habituellement, la fièvre et les autres symptômes peuvent durer de sept à dix jours, mais la toux et la faiblesse peuvent durer entre une et deux semaines de plus.

### Quel est le traitement à domicile?

Si vous contractez la grippe, rester à la maison peut contribuer à diminuer vos symptômes. Suivez les conseils ci-dessous :

- Prenez beaucoup de repos
- Buvez beaucoup de liquides pour remplacer la quantité perdue en raison de la fièvre
- Évitez de fumer et demandez aux autres de ne pas fumer à l'intérieur de la maison
- Inhalez de l'air humide en prenant une douche chaude ou en remplissant l'évier d'eau chaude pour vous aider à respirer librement
- Vous pouvez vous procurer des médicaments anti-grippaux ou antiviraux sous ordonnance, mais vous devez commencer à les prendre 48 heures avant l'apparition des symptômes pour en assurer l'efficacité. La durée des symptômes sera ainsi diminuée d'environ trois jours si les médicaments sont pris 12 heures et d'environ une journée et demie

si les médicaments sont pris deux jours avant l'apparition des symptômes

- Les médicaments contre le rhume et la toux vendus sans ordonnance sont offerts pour le soulagement des symptômes de la grippe, mais ils ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 6 ans

De l'acétaminophène (p. ex. du Tylenol®) ou de l'ibuprofène\* (p. ex. de l'Advil®) peuvent être administrés pour traiter la fièvre ou l'irritation. Il NE faut PAS donner d'AAS (p. ex., de l'aspirine®) aux moins de 18 ans, en raison des risques de syndrome de Reye.

\*Ne donnez pas d'ibuprofène aux enfants de moins de 6 mois sans en parler d'abord avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour de plus amples renseignements sur le syndrome de Reye, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 84 Le syndrome de Reye](#).

### Quand devrais-je consulter un fournisseur de soins de santé?

Consultez votre fournisseur de soins de santé le plus tôt possible si vous présentez des symptômes ressemblant à la grippe et si vous souffrez d'un problème de santé qui vous rend plus à risque d'avoir des complications.

Vous devriez également appeler votre fournisseur de soins de santé si vos symptômes s'aggravent, si vous éprouvez par exemple de l'essoufflement ou de la difficulté à respirer, des douleurs thoraciques ou des signes de déshydratation (des vertiges en position debout ou une diminution de l'urine).

### Est-ce une grippe ou un rhume?

Le tableau suivant peut vous aider à établir si vous avez la grippe ou le rhume.

### Pour de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches HealthLinkBC suivantes :

- [HealthLinkBC File n° 12a Pourquoi les personnes âgées devraient se faire administrer le vaccin antigrippal inactivé \(contre l'influenza\)](#)
- [HealthLinkBC File n° 12c Immunisation contre l'influenza \(grippe\) : Mythes et réalités](#)
- [HealthLinkBC File n° 12d Vaccin inactivé contre l'influenza \(grippe\)](#)
- [HealthLinkBC File n° 85 Lavage des mains : freinez la propagation des germes](#)



Symptômes	Rhume	Grippe (influenza)
Fièvre	Rare	Apparition habituelle ou soudaine 39° à 40 °C (102,2 à 104 °F), durée de 3 à 4 jours
Mal de tête	Rare	Habituel, peut être grave
Douleurs	Légère intensité parfois	Moyenne intensité, forte intensité parfois
Fatigue et faiblesse	Légère intensité parfois	Habituel, durée de 2 à 3 semaines ou plus
Fatigue extrême	Inhabituel	Habituel, apparition précoce, peut être grave
Congestion ou écoulement nasal	Courant	Parfois
Éternuements	Courant	Parfois
Mal de gorge	Courant	Parfois
Malaise thoracique, toux	Parfois léger à modéré	Habituel, peut être grave
Complications possibles	Congestion des sinus ou otite	Pneumonie, insuffisance respiratoire et autres complications chez les personnes souffrant de maladies chroniques
Prévention	Lavage fréquent des mains	Vaccin annuel contre la grippe et lavage fréquent des mains
Traitement	Aucun traitement spécifique disponible; soulagement des symptômes uniquement	Médicaments antiviraux sous ordonnance, pouvant réduire les symptômes

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles) ou votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.