



Cuidado dental para su bebé y su niño pequeño Dental Care for Your Infant and Toddler

Comenzar el cuidado dental temprano es importante para la salud de su hijo y para mantener unos dientes sanos durante toda la vida. Los dientes de leche sanos ayudan a que los niños coman y hablen claramente. Los dientes de leche guían a los dientes permanentes de adulto a su posición adecuada. Algunos de los dientes de leche no son reemplazados por los dientes permanentes hasta los 12 o 13 años. El cuidado dental incluye limpiar las encías de su bebé incluso antes de que los dientes salgan en la boca. Mantener los dientes y las encías de su hijo limpios es la manera más fácil de mantenerlo saludable.

¿Qué es el deterioro dental (caries) en la infancia temprana?

El deterioro dental en la infancia temprana se refiere al desarrollo de caries en niños de entre 6 meses y 6 años de edad. Una vez que a su hijo le salgan los dientes, corre el riesgo de padecer deterioro dental. Los dientes se deterioran por varios factores entre los que se incluyen las bacterias que se encuentran normalmente en la boca. Si no se trata, el deterioro dental puede extenderse por el interior del diente y causar dolor e infección, e incluso dañar el diente permanente que está debajo del de leche. Es posible que el diente o los dientes de leche tengan que ser extraídos.

¿Qué puede contribuir al deterioro dental?

Los siguientes factores pueden contribuir al deterioro dental en la infancia temprana:

- el consumo frecuente de tentempiés (especialmente alimentos pegajosos o azucarados);
- el uso constante del biberón o de la taza entrenadora llenado con bebidas azucaradas como leche, jugo o leche de fórmula (especialmente a la hora de acostarse);
y
- no cepillarle los dientes a su hijo.

Según la Canadian Dental Association (Asociación Dental de Canadá), el daño que el azúcar hace a los dientes depende de la cantidad consumida y del tiempo que permanece en la boca. Cuando su hijo come o bebe alimentos azucarados, los gérmenes (bacterias) en la boca de su hijo se mezclan con el azúcar y crean un ácido suave. Este ácido ataca la capa externa, más dura, del diente (llamada también esmalte dental) y forma la caries.

Si su hijo está siempre bebiendo jugos o comiendo tentempiés pegajosos y/o azucarados entre las comidas, sus dientes se están recubriendo de azúcar una y otra vez. El deterioro dental también se puede desarrollar cuando se

acuesta a un niño con un biberón de leche o de jugo, ya que el líquido permanece en la boca, bañando los dientes en azúcar durante un largo periodo de tiempo.

La transmisión de bacterias de su boca a la de su bebé:

Los miembros de la familia también pueden transmitirle a su hijo bacterias a través de la saliva. Puede reducir la posibilidad de transmitir las bacterias que causan la caries a su bebé evitando compartir cepillos de dientes, no lamiendo los chupetes (chupones) para limpiarlos, y no dando de comer a su bebé con una cuchara que ha estado previamente en su boca.

El riesgo de transmitir las bacterias que causan la caries, combinado con una higiene bucodental y hábitos alimenticios malos, pueden aumentar el riesgo de que su hijo desarrolle caries en la infancia temprana.

¿Cómo se puede prevenir el deterioro dental?

Practique un buen cuidado bucodental

Un buen cuidado bucodental incluye limpiar y comprobar los dientes y la boca de su hijo todos los días. Levante el labio para poder ver a lo largo de la encía cuando la limpie y busque manchas blancas o marrones que pueden ser las primeras señales del deterioro dental.

Limpe la boca de su bebé con suavidad usando un cepillo dental para bebés suave o una toalla facial mojada.

Cuando le empiecen a salir los dientes, use un cepillo de dientes poniendo una cantidad de pasta de dientes con flúor del tamaño de un grano de arroz. Lave los dientes de su hijo por la mañana y especialmente antes de acostarle. Una vez que su hijo cumpla los 3 años, cepille sus dientes poniendo una cantidad de pasta de dientes con flúor del tamaño de una “arveja (guisante)” sobre un cepillo de dientes infantil suave. Se considera que usar la pasta de dientes con flúor en estas cantidades es seguro y efectivo contra el deterioro dental.

Entre las horas de alimentación, ofrezca agua

El agua es la mejor elección entre las horas de alimentación normales y para saciar la sed. Enseñe a su bebé a usar un vaso sin tapadera entre los 6 y 9 meses de edad.

Deje de usar el biberón o la taza entrenadora a la hora de acostarse

Para obtener consejos sobre cómo puede ayudar a su hijo a dejar de usar el biberón o la taza entrenadora a la hora de acostarse, visite el sitio web de la Canadian Dental

Association - Early Childhood Tooth Decay (Deterioro dental en la infancia temprana) www.cda-adc.ca/en/oral_health/cfyt/dental_care_children/tooth_decay.asp.

¿Cuándo le saldrán los dientes a mi hijo?

Cada niño tiene su propio calendario de dentición. A la mayoría de los niños les comienzan a salir los dientes a los 6 meses. Su hijo debería tener todos sus primeros dientes (o dientes de leche) a los 3 años. Los dientes delanteros de abajo suelen aparecer primero, seguidos de los dientes delanteros de arriba. En total deberían aparecer 20 dientes (10 en la mandíbula superior y 10 en la mandíbula inferior).

Para obtener más información sobre la dentición, consulte Su salud dental: La importancia de los dientes de leche (Your Dental Health – Importance of Baby Teeth) www.bcdental.org/YourDentalHealth/YourDentalHealth.aspx?id=9969.

¿Cómo puedo consolar a mi bebé cuando le salen los dientes?

La dentición puede causar algunas molestias haciendo que su bebé se muestre incómodo. Su bebé puede encontrarse mejor si le deja morder un anillo de dentición refrigerado y limpio, un juguete para la dentición o una toalla facial limpia y mojada. Las galletas de dentición no son una buena elección porque se pueden pegar a los dientes de su bebé y causar el deterioro de los dientes.

Consulte a su médico, dentista o a su proveedor de asistencia sanitaria antes de usar cremas, geles o pastillas de dentición, o cualquier otro artículo de dentición.

La dentición no causa fiebre. Si su bebé tiene fiebre o diarrea mientras le están saliendo los dientes, trátela como lo haría en cualquier otro momento. Si tiene preguntas o algo le preocupa acerca de la fiebre o la diarrea de su bebé, llame al **8-1-1** para hablar con una enfermera o póngase en contacto con su proveedor de asistencia sanitaria.

¿Qué sucede con los chupetes o chupones?

A veces se ofrecen chupetes o chupones a los bebés durante su descanso, sueño u otros momentos. Si decide darle a su bebé un chupete, aquí tiene algunos consejos:

- asegúrese de que el amamantamiento esté bien establecido;
- elija el tamaño correcto del chupete para la boca de su bebé;
- compruebe la tetina del chupete con frecuencia (tírelo si está pegajoso, agrietado o roto);
- mantenga el chupete limpio;
- evite meter el chupete en miel u otras sustancias dulces que puedan causar el deterioro dental; y

- al año o a los dos de edad, si usa chupete, limite el uso a la hora de la siesta o a la hora de acostarse.

No se recomienda el uso de chupetes o chupones una vez que hayan salido todos los dientes de leche, generalmente cuando su hijo tenga alrededor de 3 años. Después de esta edad, el uso regular de un chupete puede afectar el desarrollo del habla del niño.

¿Puede el flúor ayudar a detener el deterioro dental?

Las Canadian Dental and Medical Associations (Asociaciones Dental y Médica de Canadá) y los profesionales dentales de la Columbia Británica recomiendan flúor para prevenir el deterioro de los dientes en personas de todas las edades.

Está demostrado que el flúor previene la caries de manera efectiva y a bajo coste. Usar la cantidad recomendada de pasta de dientes con flúor dos veces al día ayuda a reforzar el esmalte dental y a hacerlo más resistente al deterioro dental. Algunas pastas de dientes no tienen flúor. Compruébelo siempre en la etiqueta.

Su dentista o el profesional de odontología también puede ponerle flúor durante las revisiones dentales regulares.

En B.C. hay poco flúor natural y pocas ciudades añaden flúor al agua potable. Si no está seguro de si su suministro de agua contiene flúor, llame a su unidad de salud pública local. Para obtener más información acerca de la fluoración del agua, visite [HealthLinkBC File #28 Datos sobre la fluoración del agua](#).

¿Cuándo debe acudir mi hijo al dentista?

La Canadian Dental Association recomienda visitas regulares comenzando a los 6 meses después de que le salga el primer diente o cuando tenga un año. La primera visita de su hijo al dentista es un buen momento para hablar del cuidado dental diario, el flúor y los hábitos alimenticios. Si le preocupa algo con respecto a los dientes de su bebé o de su niño pequeño, concierte una cita para ver a su dentista o a un profesional de odontología.

Para más información

Los niños de familias que reciben ayuda financiera por bajos ingresos o la ayuda superior del Plan de servicios médicos (MSP premium assistance) reúnen los requisitos para cuidados dentales básicos a través del Healthy Kids Program (Programa niños sanos). Para obtener más información, llame al 1-866-866-0800 o visite www.mhr.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm

Para obtener más información sobre cuidados dentales, por favor póngase en contacto con el programa dental de su unidad de salud pública, su dentista o su higienista dental.

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthlinkbcfiles o visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito **8-1-1**. El número telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el **7-1-1**. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten.