

B 형 간염 바이러스에 감염된 상태에서도 잘 살기 Living Well with Hepatitis B Virus Infection

B 형 간염 바이러스(HBV)의 전염을 예방하려면 어떻게 해야 하나?

B 형 간염 바이러스(HBV)는 일반적으로 B 형 간염 환자의 혈액 또는 체액에 노출될 때 전염됩니다.

HBV 감염 예방에 사용할 수 있는 백신이 몇몇 있습니다. B 형 간염 예방접종은 영유아에게는 정기 아동 예방접종의 하나로써 무상으로 제공됩니다. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #105 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형 간염, 소아마비 및 b형 헤모필루스 인플루엔자\(DTaP-HB-IPV-Hib\) 백신](#)을 참고하십시오.

B 형 간염 예방접종은 1980 년 이후 출생자, 또는 특정 위험군(HBV 보균자의 동거자, 성관계 상대 등)에게도 무상으로 제공됩니다. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #25a B 형 간염 예방접종](#)을 참고하십시오.

급성 또는 만성 B 형 간염 진단을 받았을 경우, 바이러스가 타인에게 전염될 가능성을 다음과 같은 방법으로 줄일 수 있습니다:

- 임신했을 경우에는 아기에게 바이러스가 전염될 위험이 있으므로 보건 의료 서비스 제공자와 상담하십시오. 아기가 태어날 때 B 형 간염 면역 글로블린(HBIG) 및 간염 예방접종 1 차 접종을 투여하면 이 위험이 크게 줄어들 수 있습니다. 출산 전에 항바이러스제를 복용하면 아기에게 바이러스가 전염될 위험이 더 감소될 수도 있습니다. 모유 수유는 젖꼭지가 갈라졌거나 출혈이 있지 않은 한 아기에게 안전합니다
- 마약을 코로 흡입하거나, 담배처럼 피우거나, 주사하는 데 쓰는 도구(빨대, 파이프, 쿠커, 필터, 물, 주사기 등)를 다른 사람과 공동 사용하지 마십시오
- 안전한 성관계를 가지십시오. 성관계를 가질 때 항상 콘돔을 사용하면 B 형 간염 및 성병 감염 위험을 줄여줍니다. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #08o 성병\(STI\) 예방](#)을 참고하십시오
- 성관계 상대 및 동거자에게 HBV 검사를 받도록 하십시오. HBV 를 보유하고 있지 않을 경우에는 B 형 간염 예방접종을 맞아야 합니다

- 혈액, 정자, 장기, 조직 등을 기부하지 마십시오
- 혈액제제 또는 조직이식재를 기부하거나 기부받은 적이 있을 경우, 보건 의료 서비스 제공자에게 알려십시오
- 면도기, 칫솔, 잇실, 손톱깎이, 또는 미량의 피가 묻어 있을 수 있는 기타 미용용품 또는 의도기를 다른 사람과 공동 사용하지 마십시오
- 열린상처는 아물 때까지 붕대로 감싸 놓으십시오
- 피가 묻은 물품은 별도의 비닐 봉지에 넣어 집 쓰레기통에 버리십시오(붕대, 티슈, 탐폰, 면도기, 잇실 등)
- 피가 묻어 있을 수 있는 가정용품 또는 미용용품은 표백액으로 닦으십시오. 물 9, 표백액 1 의 비율로 혼합하십시오. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #97 혈액 또는 체액 접촉: 감염 예방](#)을 참고하십시오
- 여러분의 혈액/체액에 노출된 적이 있는 사람에게 여러분이 B 형 간염 환자임을 알려십시오. 노출 유형과 예방접종 이력에 따라 이들은 혈액검사를 받은 다음 B 형 간염 예방접종 및/또는 B 형 간염 면역 글로블린을 맞아야 할 수도 있습니다. 취약한 사람은 예방접종을 맞음으로써 HBV 감염 위험을 줄일 수 있습니다. 성 접촉, 손상된 피부 또는 눈/입/코의 손상된 점막과의 접촉이 이루어진 노출일 경우, 되도록 빨리(48 시간 이내) 보건 의료 서비스 제공자에게 진찰을 받아야 합니다

어떤 경우에 B 형 간염 바이러스가 전염되지 않나?

HBV 는 다음 경로로는 전염되지 않습니다:

- 사무실 또는 학교 등 환경에서의 일상적 접촉
- 기침 또는 재채기
- 포옹, 키스 등의 신체적 접촉
- 접시, 나이프, 포크 등 식기의 공동 사용, 또는 식사 나누어 먹기
- 모유 수유(젖꼭지가 갈라졌거나 출혈이 있을 경우는 예외)
- 건강한 피부가 다른 사람의 체액(침, 소변, 대변, 토사물 등)과 접촉할 경우

B 형 간염 바이러스는 사람에게 어떤 영향을 끼치나?

성인 및 만 5 세 이상 아동은 구역, 구토, 복통, 극심한 피로, 발열, 식욕부진, 황달 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 대부분의 만 5 세 미만 아동과 면역 체계가 약화된 성인은 아무 증상도 나타나지 않습니다.

대부분의 성인은 바이러스가 저절로 없어지고 완전히 치유됩니다. 건강한 성인의 5% 미만만 만성 B 형 간염에 걸리며, 태어날 때 감염된 영유아는 대부분 만성 B 형 간염이 생깁니다. 이 장기 감염은 간이 손상되어 딱딱해지는 간경변증으로 발전할 수 있습니다. 그리고 소수의 경우, 간경변증은 간부전 및/또는 간암으로 발전할 수 있습니다. 만성 B 형 간염에 걸렸을 경우, 간암 검사에 관해 보건의료 서비스 제공자와 상담해야 합니다.

B 형 간염은 치료할 수 있나?

급성 B 형 간염은 치료법이 없습니다. 만성 B 형 간염은 간 손상 속도를 늦추어주고 간암 발병 가능성을 줄여줄 수 있는 약은 하지만 치료법은 없습니다.

치료가 필요할 경우, 정기적으로 보건의료 서비스 제공자에게 진찰을 받으면서 간이 정상적인 기능을 하고 있는지 확인해야 합니다.

HBV 감염 상태에서도 되도록 건강하게 살려두어 어떻게 해야 하나?

- 알코올은 HBV 에 의한 간 손상을 촉진하므로 금주하십시오
- HBV 감염을 잘 관리하여 건강을 잘 지키는 것이 중요합니다. HBV 는 취업 장벽이 될 수 없습니다
- 보건의료 서비스 제공자, 거주지 관할 보건소, 지지집단, 캐나다간재단(Canadian Liver Foundation) 웹사이트(www.liver.ca) 등을 통해 HBV 에 관해 더 자세히 알아보십시오
- 정기적으로(일반적으로 1 년에 두 번쯤) 보건의료 서비스 제공자에게 진찰을 받으십시오
- 새로운 약이나 영양제(일반의약품 및 약초제 포함)를 복용하고자 할 때는 먼저 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오. 이부프로펜은 삼가하십시오
- HIV, C 형 간염 바이러스 및 기타 성병 검사를 받으십시오. 자세히 알아보려면

<https://smartsexresource.com> 및 <https://getcheckedonline.com> 을 방문하십시오

- A 형 간염 면역력이 없을 경우에는 예방접종을 받으십시오. B 형 간염 환자에게는 무상으로 제공됩니다. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #33 A 형 간염 예방접종](#) 을 참고하십시오
- 폐구균 다당 백신을 맞고, 5 년 후에 추가 접종을 받으십시오. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #62b 폐구균 다당 백신](#) 을 참고하십시오
- 해마다 인플루엔자 예방접종을 받으십시오. B 형 간염 환자에게는 무상으로 제공되며, 보통 10 월에 백신이 나옵니다. 예방 효과를 극대화하려면 백신이 나오자마자 맞아야 합니다. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #12d 비활성화 인플루엔자\(독감\) 백신](#) 을 참고하십시오
- ‘캐나다 식품가이드에 따른 올바른 식생활(Eating Well with Canada’s Food Guide)’에 기술되어 있는, 건강에 유익하고 영양가 높은 식품을 섭취하십시오. 자세히 알아보려면 다음 웹사이트를 참고하십시오: <https://food-guide.canada.ca/en/>
- 규칙적으로 운동하십시오
- 흡연을 삼가하십시오. 담배 끊기에 관해 알아보려면 [HealthLinkBC File #30c 담배 끊기](#) 를 참고하십시오
- 주사기로 마약을 투여하는 사람은 마약 사용 기구를 다른 사람과 공동 사용하지 않고, 마약을 주사할 때마다 소독된 기구를 사용함으로써 B 형 간염 및 기타 혈액매개 병원균 감염 위험을 줄일 수 있습니다. 마약 사용 관리에 관해 알아보려면 HeretoHelp 웹사이트 www.heretohelp.bc.ca 를 방문하거나, 하루 24 시간 무료로 도움을 제공하는 310-6789 로 전화하십시오
- 마약 사용자는 'Toward the Heart' 웹사이트 <http://towardtheheart.com> 에서 마약 과용 인식, 예방, BC 주의 날록손보급프로그램(Take Home Naloxone Program) 등에 관해 알아보십시오



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

더 많은 HealthLinkBC File 주제를 찾아보려면 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 또는 관내 보건소를 방문하십시오. BC주 내에서 비응급 보건 정보 및 조언을 찾아보려면 www.HealthLinkBC.ca 를 방문하거나 8-1-1 (무료 전화)로 전화하십시오. 청각 장애 관련 지원을 받으려면 7-1-1로 전화하십시오. 요청에 따라 130여 개 언어로의 번역 서비스가 제공됩니다.