

Pérdida auditiva en niños Hearing Loss in Children

El oído juega un papel importante en el desarrollo social y emocional de su hijo. La capacidad para oír bien también le sirve de apoyo a su hijo a medida que aprende a hablar y finalmente a leer y escribir. Es importante que lleve a su hijo a que se le realice una prueba de audición si sospecha que él o ella no oye bien o no habla con claridad.

¿Qué puedo hacer si pienso que mi hijo tiene problemas auditivos?

La pérdida auditiva puede ser difícil de detectar. Una pérdida auditiva leve en ocasiones se confunde con otros problemas y puede causar que un niño parezca distraído o retraído.

Generalmente, los padres son los primeros en notar si hay un problema.

Si algo le preocupa, lleve a su hijo a un audiólogo para que le realice una prueba de audición, incluso si los resultados de una prueba anterior han sido normales. Contacte a la clínica de audición de su unidad de salud pública local o al proveedor de asistencia sanitaria de su familia para averiguar cómo le pueden referir a un audiólogo.

Visite a su proveedor de asistencia sanitaria de inmediato si su hijo tiene cualquiera de los siguientes síntomas:

- Secreción del oído (líquido que sale del oído)
- Otolgia (dolor en el oído)
- Mal olor proveniente del conducto auditivo
- Piel enrojecida alrededor del oído
- Un objeto en el conducto auditivo
- Una lesión en el oído

¿Puede cambiar la capacidad auditiva?

Sí, la capacidad auditiva puede cambiar con el tiempo. Estos cambios en la audición pueden ser temporales o permanentes. La mayoría de las

pérdidas auditivas en niños pequeños son temporales o se pueden tratar médicamente.

¿Qué puede afectar la capacidad auditiva de mi hijo?

Las causas más comunes de pérdida auditiva temporal en los niños incluyen:

- Líquido en el oído medio
- Acumulación de cera que obstruye el conducto auditivo
- Paladar hendido

Algunas causas comunes de pérdida auditiva permanente en los niños incluyen:

- Pérdida auditiva genética, incluso si nadie más en la familia presenta pérdida auditiva
- Enfermedades en la infancia como meningitis, sarampión, paperas o encefalitis
- Algunas infecciones presentes al nacer como citomegalovirus (CMV), toxoplasmosis o rubéola
- Algunos síndromes como el de Down, el de Pendred y el de Alport
- Peso bajo al nacer: menos de 1200 gramos (2,65 libras)
- Un parto difícil que afectó la respiración
- Estancia de más de 2 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales
- Estar conectado a un respirador o recibir el tratamiento de la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) de recién nacido
- Niveles muy altos de bilirrubina al nacer que necesiten una exanguinotransfusión
- Recibir determinados medicamentos en el período neonatal
- Trastorno cerebral o del sistema nervioso
- Exposición a ruidos excesivos o exposición prolongada a ruidos

¿Qué puedo hacer para proteger la capacidad auditiva de mi hijo?

Con frecuencia, la pérdida auditiva no se puede prevenir. Sin embargo, puede ayudar a proteger la capacidad auditiva (el oído) de su hijo utilizando dispositivos de protección auditiva en entornos ruidosos, como en espectáculos de fuegos artificiales y en eventos deportivos, y manteniendo alejados a los niños de sustancias nocivas como el humo de los cigarrillos. Para obtener más información sobre cómo el humo de segunda mano puede ser perjudicial para los bebés y niños, consulte [HealthLinkBC File #30a Los efectos nocivos del humo de segunda mano](#).

Además, inmunizar (vacunar) a su hijo ayuda a prevenir enfermedades que puedan causar la pérdida auditiva permanente.

¿Cuáles son los logros en el habla y el lenguaje para la edad de mi hijo?

Del nacimiento a los 3 meses

- Se sobresalta o llora con sonidos fuertes
- Se calla o sonrío cuando le hablan
- Hace sonidos de arrullo

De 4 a 6 meses

- Mueve la cabeza en la dirección de los sonidos
- Presta atención a la música
- Presta atención a juguetes que hacen sonidos
- Balbucea usando sonidos parecidos a los del habla
- Usa una variedad de tonos en gritos, gemidos y risas

De 7 a 12 meses

- Se da la vuelta y mira en la dirección de los sonidos
- Reconoce las palabras de objetos comunes como taza, jugo o zapato
- Comienza a responder a peticiones como “ven aquí” o “¿quieres más?”
- Imita distintos sonidos del habla

- Comienza a decir sus primeras palabras como mamá y papá alrededor de los 12 meses

De 1 a 2 años

- Señala las partes del cuerpo cuando se lo piden
- Sigue órdenes sencillas
- Dice más palabras cada mes
- Comienza a juntar 2 palabras

De 2 a 3 años

- Sigue dos peticiones juntas, como toma el juguete y ponlo en la silla
- Escucha cuentos durante un período de tiempo más largo
- Usa de 2 a 3 palabras para hablar y pedir cosas
- Con frecuencia le entienden las personas que están con él o ella la mayor parte del tiempo

Para más información

Para obtener información acerca de pruebas auditivas o pérdida auditiva, consulte los siguientes archivos de HealthLinkBC:

- [HealthLinkBC File #71b Pruebas auditivas para bebés y niños](#)
- [HealthLinkBC File #71c Pérdida auditiva en adultos](#)

Para obtener más información acerca de inmunizaciones infantiles, consulte los siguientes archivos de HealthLinkBC:

- [HealthLinkBC File #50a El sistema inmunitario de su bebé y las vacunas](#)
- [HealthLinkBC Files #50b Las ventajas de inmunizar a su hijo/a](#)
- [HealthLinkBC Files #50c Las vacunas infantiles son seguras](#)
- [HealthLinkBC File #50d Las vacunas infantiles: Qué contienen y por qué](#)
- [HealthLinkBC File #50e Una mejor experiencia de inmunización para su hijo\(a\)](#)

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten.