



Giang Mai Syphilis

Giang mai là gì?

Giang mai là một sự nhiễm khuẩn được truyền qua từ màng nhầy niêm mạc của một người bị nhiễm bệnh. Sự nhiễm khuẩn có 4 giai đoạn: thời kỳ thứ nhất, thời kỳ thứ nhì, tiềm ẩn buổi đầu và tiềm ẩn về sau.

Làm thế nào tôi có thể mắc bệnh giang mai?

Quý vị có thể bị giang mai khi có sự tiếp xúc giữa da với da hoặc sự trao đổi các chất dịch cơ thể với một người có một chỗ đau (vết thương) bệnh giang mai lây nhiễm hoặc da nổi sài. Điều này có thể xảy ra qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc làm tình bằng miệng, tiếp xúc với cơ quan sinh dục, hoặc trực tràng của một người khi có sự hiện diện của một vết thương hoặc vết sài của bệnh giang mai. Giang mai cũng có thể truyền từ mẹ sang con trong lúc mang thai hoặc khi sinh con.

Tuy cả phụ nữ lẫn nam giới đều có thể mắc bệnh giang mai, đại đa số những người được chẩn đoán mắc bệnh giang mai tại B.C. là đàn ông, những người nhận mình là đồng tính luyến ái nam, lưỡng tính, hoặc nam làm tình với nam (MSM). Tỷ lệ bệnh giang mai đã tăng rất nhiều cho MSM, hầu hết ở những người từ 20 đến 24 tuổi.

Nếu quý vị có một bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục (sexually transmitted infection, viết tắt STI) khác, quý vị có nhiều rủi ro bị bệnh giang mai hơn.

Các triệu chứng là gì?

Mỗi giai đoạn của bệnh giang mai có một số các triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng có thể thay đổi hoặc rất nhẹ khiến quý vị có thể không biết mình đã bị bệnh giang mai.

Để biết xem quý vị có bệnh giang mai hay không, quý vị phải được khám bởi một chuyên viên chăm sóc sức khỏe và phải thử máu và (các) vết đau nhức.

Giai đoạn thứ nhất

Ở giai đoạn đầu, một vết lở không đau có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên cơ thể quý vị sau khi có sự tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh giang mai. Vết lở thường xuất hiện khoảng 3 tuần sau lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ 3 đến 90 ngày sau khi bị nhiễm khuẩn. Đôi khi sẽ không nhận thấy vết đau trên cơ thể quý vị. Vết đau sẽ tự hết đi trong vòng một vài tuần, tuy nhiên bệnh sẽ tiếp tục lây lan.

Giai đoạn thứ nhì

Giai đoạn thứ nhì thường bắt đầu khoảng từ 2 đến 12 tuần sau khi bị nhiễm bệnh giang mai, nhưng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào từ 2 tuần đến 6 tháng từ lúc bị nhiễm khuẩn. Trong giai đoạn này, một vết sài không ngứa có thể xuất hiện. Vết sài có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên cơ thể quý vị, nhưng thường được tìm thấy ở trên ngực, ở bụng, ở bộ phận sinh dục, trong lòng bàn tay, và ở lòng bàn chân của quý vị. Quý vị có thể không nhận thấy việc bị nổi sài, nhưng quý vị vẫn có thể truyền bệnh sang cho những người khác. Vết sài thường biến mất nhưng có thể xuất hiện trở lại vài tháng sau đó. Các triệu chứng khác có thể bao gồm nhức đầu, sốt, rụng tóc, sưng hạch bạch huyết và nổi các khối u và các đốm màng nhầy bên trong miệng, ở dương vật hoặc ở âm đạo.

Các giai đoạn tiềm ẩn

Sau khi vết sài hết đi và nếu quý vị không được điều trị, bệnh sẽ tiến triển sang giai đoạn tiềm ẩn, hoặc lặn của bệnh giang mai. Quý vị có thể không có bất cứ các triệu chứng nào trong một khoảng thời gian. Giai đoạn tiềm ẩn có thể kéo dài cho tới 30 năm.

- Giai đoạn tiềm ẩn ban đầu: khi một người đã bị nhiễm bệnh giang mai trong năm vừa qua. Những người nào có bệnh giang mai 'giai đoạn đầu' có thể lây nhiễm một cách dễ dàng cho những người bạn tình của họ

- Giai đoạn tiềm ẩn về sau: khi một người bị nhiễm bệnh giang mai trong hơn 1 năm. Nếu quý vị không được điều trị, quý vị có thể tiếp tục bị nhiễm bệnh giang mai trong nhiều năm mà không có bất cứ các dấu hiệu hoặc triệu chứng nào

Làm thế nào để xét nghiệm tìm bệnh giang mai

Hãy gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị để được giới thiệu đến phòng xét nghiệm thử máu và bất cứ (các) vết đau nhức nào.

Những người nam làm tình với nam (MSM) được khuyến nên kiểm tra tìm bệnh giang mai mỗi 3 đến 6 tháng, hoặc ngay lập tức nếu quý vị có các triệu chứng, chẳng hạn như bị đau nhức hoặc nổi sởi.

Kiểm tra tìm bệnh giang mai được đề nghị như một phần của việc kiểm tra tiền sản cho phụ nữ mang thai. Nếu quý vị có thai, hãy thảo luận các yếu tố rủi ro mắc các bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục (STIs) của quý vị với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của mình trong suốt thời gian mang thai để xác định nhu cầu kiểm tra tìm bệnh STI, kể cả giang mai.

Quý vị có thể tiếp cận một cách trực tiếp tại một số địa điểm phòng xét nghiệm tại B.C. Để tìm cơ sở xét nghiệm gần nhất hoặc để được xét nghiệm trực tuyến, xin truy cập mạng Smart Sex Resource (Nguồn Tài Liệu Hướng Dẫn Cách Làm Tình Khôn Ngoan) tại <https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it> và/hoặc Get Checked Online (Đề Được Kiểm Tra Trực Tuyến Trên Mạng) tại www.getcheckedonline.com.

Các biến chứng là gì?

Nếu quý vị không được trị bệnh giang mai, các biến chứng có thể xảy ra khi mới nhiễm bệnh hoặc vài năm sau đó. Các biến chứng có thể về thần kinh (chẳng hạn như mất thính giác hoặc thị lực, hoặc bị chóng mặt) hay não của quý vị bị thiệt hại, tim và các cơ quan nội tạng trong cơ thể quý vị bị tổn thương, có thể đưa đến tử vong.

Phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai mà không điều trị có thể gây các biến chứng cho đứa con của cô ấy. Việc bị sẩy thai, sinh non hoặc thai chết trong bụng mẹ, sinh con với số cân thấp, hoặc khiến cho em bé sinh ra bị bệnh giang mai (được gọi là mắc bệnh giang mai bẩm sinh).

Sự điều trị là gì?

Trong bất cứ giai đoạn nào, giang mai đều có thể chữa trị được bằng kháng sinh. Việc điều trị bằng thuốc kháng sinh không thể đảo ngược sự thiệt hại đã gây nên bởi bệnh giang mai ở giai đoạn tiềm ẩn về sau, nhưng việc điều trị có thể ngăn ngừa sự thiệt hại thêm nữa. Sau khi được điều trị, quý vị phải thử máu lại để chắc chắn việc điều trị có kết quả.

Bất cứ (những) người bạn tình nào của quý vị cũng sẽ cần phải được khám bệnh, làm xét nghiệm và nếu bị nhiễm khuẩn, phải được trị bệnh giang mai. Đừng làm tình cho tới 2 tuần sau khi quý vị và (những) người bạn tình của quý vị đã hoàn tất việc điều trị và quý vị được xác nhận sự điều trị đã có hiệu quả.

Các viên thuốc ngừa thai của tôi có tác dụng hay không nếu tôi dùng thuốc trụ sinh?

Có rất ít bằng chứng cho thấy thuốc trụ sinh làm giảm tác dụng của các hình thức ngừa thai bằng nội tiết tố. Các ví dụ của việc ngừa thai bằng nội tiết tố bao gồm uống thuốc viên, dùng miếng dán, đặt vòng ngừa thai, hoặc chích thuốc. Nếu quý vị đang được điều trị bằng kháng sinh, điều quan trọng phải tiếp tục dùng biện pháp ngừa thai như quý vị vẫn làm lúc bình thường. Nếu quý vị có điều lo lắng, hãy sử dụng bao cao su ngừa thai cho đến lần kinh nguyệt kế tới của quý vị sau khi đã hoàn tất việc dùng thuốc trụ sinh, hoặc hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết thêm chi tiết.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về cách làm thế nào quý vị có thể giảm thiểu rủi ro mắc bệnh STI, xin xem [HealthLinkBC File #08o Ngừa Các Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Sinh Dục \(STIs\)](#).



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp tại B.C., xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho người điếc và lạng tai, xin gọi 7-1-1. Các dịch vụ dịch thuật có sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu.