

丙型腦膜炎球菌(Men-C)結合疫苗 Meningococcal C Conjugate (Men-C) Vaccine

保護你孩子的健康。
讓他們按時接種疫苗。

若你能讓孩子按時接種所有疫苗，他們便能終身避免許多疾病的威脅。

在加拿大過去的 50 年裡，免疫接種比其他任何健康措施挽救的生命都要多。

甚麼是 Men-C 疫苗？

Men-C 疫苗能預防丙型腦膜炎球菌感染，這是最常見的腦膜炎球菌之一。該疫苗已經獲得加拿大衛生部批准。

Men-C 疫苗作為兒童常規免疫的一部分，免費為您的孩子提供。請致電您的醫護人員，安排接種。

誰應該接種 Men-C 疫苗？

Men-C 疫苗一般在嬰兒期接種，共 2 劑。第 1 劑在 2 個月時接種，第 2 劑在 12 個月時接種。該疫苗與其他兒童期疫苗一起接種。

Men-C 疫苗	兒童接種年齡
第一劑	2 個月
第二劑	12 個月

以下人士也可接種 Men-C 疫苗：

- 出生於 20002 年前、年齡在 24 歲或以下且在其 10 歲生日當天或此後未接種該疫苗者；
- 18 歲及以上曾接受過幹細胞移植者；以及

- 與丙型腦膜炎球菌感染者有密切接觸的人士。

請務必妥善保存所有的免疫接種記錄。

接種該疫苗有哪些好處？

該疫苗能預防丙型腦膜炎球菌感染。接種該疫苗是預防此類嚴重、有時甚至致命的疾病的最佳途徑。

您給孩子接種疫苗的時，也幫助保護了其他人。

接種該疫苗後可能出現哪些反應？

疫苗非常安全。接種疫苗帶來的不適，遠比患上腦膜炎球菌疾病要輕微得多。接種該疫苗後可能出現的常見反應包括接種部位疼痛和紅腫。接種疫苗後的 24 小時內也有可能出現發熱、嗜睡、易怒、食慾減退、噁心、頭痛或肌肉疼痛。這些反應很輕微，通常只持續 1-2 天。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 Acetaminophen (例如泰諾 Tylenol®) 或布洛芬 ibuprofen* (例如雅維 Advil®)。不應該給 18 歲以下人士服用乙酰水楊酸 ASA (例如阿司匹林 Aspirin®)，因為有造成雷氏綜合症 Reye Syndrome 的危險。

*在事先沒有與醫護人員溝通的情況下，不應該給 6 個月以下的兒童服用布洛芬。

如要了解雷伊氏綜合症詳情，請參閱 [HealthLinkBC File #84 雷伊氏綜合症](#)。

接種任何疫苗後，都必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在非常罕見的情況下（概率低

於百萬份之一)可能會出現名為「全身性過敏反應」(anaphylaxis)的可致命反應。其癥狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難,以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應,您的醫護人員可以為您治療。緊急療法包括注射名為 epinephrine 的腎上腺素,以及由救護車將您就近轉送至醫院急診部。若您在離開診所後出現這些反應,請致電 **9-1-1** 或當地緊急救助電話。

謹記,如有任何嚴重或未曾預料到的反應,請告訴醫護人員。

哪些人不應接種 Men-C 疫苗?

如果您的孩子曾因接種腦膜炎球菌疫苗或對該疫苗中的任何成分或乳膠出現過危及性命的反應,請告訴您的醫護人員。

您無需因感冒或其他輕微疾病推遲疫苗接種。然而,如果您有任何疑慮,請諮詢您的醫護人員。

甚麼是丙型腦膜炎球菌感染?

丙型腦膜炎球菌感染是由丙型腦膜炎球菌這種細菌引起的,它可以導致嚴重甚至致命的感染,包括腦膜炎(大腦薄膜感染)和敗血症(血液感染)。即使病人接受治療,該疾病的致死率仍高達 15%。永久性的並發症包括大腦損傷和耳聾。

腦膜炎球菌感染經由咳嗽、打噴嚏或近距離的面對面接觸在人與人之間傳播,亦可通過唾液傳播。嬰幼兒可在與其他兒童共用安撫奶嘴、奶瓶或玩具時染上疾病。較年長的兒童和成人,若與感染者接吻或共享食物、飲品、香煙、唇膏、水瓶、運動用牙套或樂器的吹嘴,亦可染上疾病。

由于推行兒童常規免疫接種計劃,丙型腦膜炎球菌感染目前在卑詩省已很罕見。

大齡未成年人同意接種疫苗

我們建議家長或監護人與子女先討論是否同意接種疫苗。年齡未滿 19 歲的兒童,如能瞭解接種疫苗的好處、每種疫苗的可能反應,以及不接種疫苗的風險,可以就同意或拒絕接種疫苗作做合法決定。若要瞭解更多有關大齡未成年人同意接種疫苗的資訊,請參閱 [HealthLinkBC File #119 嬰幼兒法案、大齡未成年人同意書及疫苗接種](#)。

如要了解疫苗注射詳情,可瀏覽 [ImmunizeBC](#) (卑詩疫苗注射) 網站: <https://immunizebc.ca/> (英文網站)。

