



## Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C) Meningococcal C Conjugate (Men-C) Vaccine

**Mantenga seguro a su niño.**

**Vea que reciba todas sus vacunas a tiempo.**

Al recibir sus vacunas a tiempo, su niño puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

Las inmunizaciones han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida sanitaria.

### ¿Qué es la vacuna Men-C?

La vacuna Men-C protege contra las infecciones por uno de los tipos más comunes de bacterias meningocócicas, el tipo C. La vacuna ha sido aprobada por Health Canada (Departamento de Salud de Canadá).

La vacuna Men-C se administra de manera gratuita como parte de las vacunaciones regulares de su hijo. Llame a su proveedor de asistencia sanitaria para concertar una cita.

### ¿Quién debe recibir la vacuna Men-C?

La vacuna Men-C se administra a los niños pequeños en una serie de 2 dosis. La primera se administra a los 2 meses de edad y la segunda a los 12 meses. La vacuna se administra junto con otras vacunas infantiles.

Vacuna Men-C	Edad del niño en la vacunación
1ª dosis	2 meses
2ª dosis	12 meses

La vacuna también se puede administrar a personas que:

- han nacido antes del año 2002, tienen 24 años de edad o menos y no han recibido una dosis de la

vacuna al cumplir los 10 años de edad o después;

- tienen 18 años de edad y más que han tenido un trasplante de células madre; y
- hayan tenido contacto cercano con alguien que tenga la enfermedad meningocócica tipo C.

Es importante guardar un registro de todas las vacunas recibidas.

### ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna?

Las vacunas que protegen contra la infección meningocócica tipo C son la mejor manera de proteger a su hijo contra esta enfermedad grave y en ocasiones mortal.

Cuando vacuna a su hijo, también ayuda a proteger a los demás.

### ¿Cuáles son las posibles reacciones después de recibir la vacuna?

Las vacunas son muy seguras. Es mucho más seguro vacunarse que contraer la enfermedad meningocócica. Reacciones comunes a la vacuna pueden incluir dolor, enrojecimiento e hinchazón donde se recibió la vacuna. También pueden presentarse fiebre, somnolencia, mal humor, pérdida de apetito, náuseas, dolor de cabeza o dolor muscular en las 24 horas posteriores a la vacunación. Estas reacciones son leves y generalmente duran de 1 a 2 días.

Se puede dar acetaminofén (p. ej. Tylenol®) o ibuprofeno\* (p. ej. Advil®) para la fiebre o el dolor. No se debe dar AAS (p. ej. Aspirina®) a ninguna persona menor de 18 años de edad debido al riesgo del síndrome de Reye.

\*No se debe dar ibuprofeno a niños menores de 6 meses de edad sin consultar antes a su proveedor de asistencia sanitaria.

Para obtener más información sobre el Síndrome de Reye, consulte [HealthLinkBC File #84 Síndrome de Reye](#).

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna porque existe la posibilidad, extremadamente inusual, menos de 1 en un millón, de tener una reacción alérgica, llamada anafilaxia, que puede poner en peligro la vida. Ésta puede incluir urticaria, dificultad para respirar, o inflamación de la garganta, lengua o labios. Si esta reacción ocurriera, su proveedor de asistencia sanitaria está preparado para tratarla. El tratamiento de emergencia consiste en la administración de epinefrina (adrenalina) y el traslado en ambulancia al servicio de urgencias más cercano. Si desarrolla síntomas después de haber dejado la clínica, llame al **9-1-1** o al número de emergencia local.

Es importante informar siempre acerca de todas las reacciones graves o inesperadas a su proveedor de asistencia sanitaria.

### ¿Quién no debe recibir la vacuna Men-C?

Hable con su proveedor de asistencia sanitaria si su hijo ha sufrido una reacción potencialmente mortal a una dosis anterior de la vacuna meningocócica, a cualquier componente de la vacuna o al látex.

No es necesario retrasar la vacunación por un resfriado u otra enfermedad leve. Sin embargo, si algo le preocupa, hable con su proveedor de asistencia sanitaria.

### ¿Qué es la infección meningocócica C?

La infección meningocócica C está causada por la bacteria llamada meningococo tipo C. Puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales incluyendo meningitis, una infección de la membrana que recubre el cerebro, y septicemia, una infección de la sangre. De cada 100 personas que contraen la enfermedad, hasta 15 pueden morir, incluso si reciben tratamiento. Entre las

complicaciones permanentes por la infección se incluyen daño cerebral y sordera.

La infección meningocócica se transmite de persona a persona al toser, estornudar o por un contacto cercano cara a cara. También se puede transmitir por medio de la saliva. Los bebés y los niños pequeños pueden contraer la enfermedad al compartir chupones, biberones o juguetes usados por otros niños. Los niños mayores y los adultos pueden contraer la enfermedad a través de actividades como besar a alguien, o compartir comida, bebida, cigarrillos, lápices de labios, botellas de agua, protectores bucales para el deporte o boquillas de instrumentos musicales.

La enfermedad meningocócica tipo C es ahora poco común en B.C. debido a los programas regulares de inmunización infantil.

### Consentimiento del menor maduro

Se recomienda que los padres o tutores hablen con sus hijos sobre el consentimiento para la inmunización (vacunación). Los niños menores de 19 años de edad que puedan comprender los beneficios y las posibles reacciones de cada vacuna, así como el riesgo de no inmunizarse, legalmente pueden consentir o rechazar las inmunizaciones. Para obtener más información sobre el consentimiento del menor maduro, visite [HealthLinkBC File #119 La Ley de Infantes, el consentimiento del menor maduro y la inmunización](#).

Para obtener más información sobre las inmunizaciones, visite ImmunizeBC en <https://immunizebc.ca/>.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control  
An agency of the Provincial Health Services Authority

---

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles) o visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan emergencia), vea [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) o llame al número gratuito **8-1-1**. El número telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el **7-1-1**. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten.