



嬰兒乙肝疫苗 Hepatitis B Infant Vaccine

保護您孩子的健康。
讓他們按時接種疫苗。

如果能按時接種所有疫苗，您的孩子就能
終身預防許多疾病。

在加拿大，過去 50 年間，免疫接種比任何
其他醫療手段挽救的生命都要多。

甚麼是乙肝疫苗？

乙肝疫苗能預防乙型肝炎病毒。該疫苗已
獲加拿大衛生部批准。

乙肝疫苗作為兒童常規免疫項目予以免費
接種。請聯繫您的醫護人員，安排接種。

哪些人應接種乙肝疫苗？

嬰兒共需接種 3 劑乙肝疫苗，分別在 2 個
月、4 個月和 6 個月時接種。乙肝疫苗常
與其它兒童期疫苗（如白喉、破傷風、百
日咳、小兒麻痺和乙型流感和嗜血桿菌疫苗）
混合接種。如需了解更多資訊，請參閱
[HealthLinkBC File #105 白喉、破傷風、
百日咳、乙肝、小兒麻痺和乙型流感和嗜血
桿菌 \(DTaP-HB-IPV-Hib\) 疫苗。](#)

乙肝疫苗	兒童接種年齡
第 1 劑	2 個月
第 2 劑	4 個月
第 3 劑	6 個月

部分嬰兒感染乙肝的風險較高，需在出生
時即進行免疫接種。如需瞭解更多資訊，
請參閱 [HealthLinkBC File #25d 為初生嬰
兒預防乙型肝炎。](#)

請務必保存好所有的免疫接種記錄，這很
重要。

接種乙肝疫苗有哪些好處？

接種乙肝疫苗是預防乙肝及包括永久性肝
臟損傷在內的併發症的最佳途徑，永久性
肝臟損傷可導致肝癌甚至死亡。

您為孩子接種疫苗的時，也幫助保護了
其他人。

接種該疫苗後可能出現哪些反應？

疫苗非常安全。接種該疫苗遠比讓孩子感
染乙肝更為安全。

對該疫苗的一般反應包括注射部位疼痛和
紅腫，部分兒童可能出現發熱、煩躁和乏
力症狀。

如有發燒或酸痛，可服用醋氨酚
Acetaminophen (例如泰諾®) 或布洛芬
ibuprofen* (例如雅維 Advil®)。不應該給 18
歲以下人士服用乙酰水楊酸 ASA (例如阿司匹
林 Aspirin®)，因為有造成雷伊氏綜合症
Reye Syndrome 的危險。

*在事先沒有與醫護人員溝通的情況下，
不應該給 6 個月以下的兒童服用布洛芬。

如要了解雷伊氏綜合症詳情，請參閱
[HealthLinkBC File #84 雷伊氏綜合症。](#)

進行任何免疫接種後，都必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在罕見的情況下（概率低於百萬分之一）可能會出現名為「全身性過敏反應」（anaphylaxis）的可致命反應。其徵狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難，以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應，您的醫護人員可以為您治療。緊急療法包括注射腎上腺素，以及由救護車將您就近送往醫院急診部。若您在離開診所後出現這些反應，請致電 **9-1-1** 或當地緊急救助電話。

謹記，如有任何嚴重或未曾預料到的反應，請告訴醫護人員。

哪些人不應接種乙型肝炎疫苗？

如果您的孩子曾因接種乙型肝炎疫苗或對該疫苗中的任何成分（包括酵母）或乳膠出現過危及性命的反應，請告訴您的醫護人員。

您無需因感冒或其他輕微疾病推遲疫苗接種。但若有疑慮，請與醫護人員商議。

甚麼是乙型肝炎？

乙肝病毒是一種侵襲肝臟的病毒，它可以導致嚴重的健康問題，包括肝臟損傷（肝硬化）。乙肝也是肝癌這種可致命疾病的主要致病因之一。乙肝病毒通過接觸感染者的血液或體液傳播。使用帶血的物品（如牙刷、剃刀或注射毒品的針頭）和與該病毒感染者進行無保護性交也可能傳播乙肝病毒。

感染乙肝病毒的母親有可能在生產時將病毒傳給寶寶。感染乙肝病毒的嬰兒通常不會出現徵狀，但其中大多數會終身攜帶該病毒。所以讓孩子在年幼時進行免疫接種以獲得保護就顯得至關重要。



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

如需查找有關更多話題的HealthLinkBC文檔，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 網頁，或訪問您當地的公共衛生單位。如需在卑詩省內獲取非緊急健康資訊和建議，請訪問 www.HealthLinkBC.ca，或致電 **8-1-1**（免費電話）。失聰和弱聽人士如需協助，請致電**7-1-1**。若您需要，我們亦可提供130多種語言的翻譯服務。