



여러분의 아기가 태어날 때 B 형 간염으로부터 보호하기

Protecting Your Baby against Hepatitis B at Birth

**자녀를 안전하게 지켜주십시오.
모든 예방접종을 제때 맞히십시오.**

모든 예방접종을 제때 맞으면 평생
각종 질병으로부터 보호될 수
있습니다.

캐나다에서 예방접종은 지난 50년간 다른 어느
보건 시책보다 많은 생명을 구했습니다.

B 형 간염 예방접종이란?

B 형 간염 예방접종은 B 형 간염 바이러스로부터
보호해줍니다. 캐나다 보건부(Health Canada)가
승인한 이 예방접종은 정기 영유아 예방접종의
하나로서 무상 제공됩니다.

B 형 간염이란?

B 형 간염은 간을 공격하는 바이러스입니다.
아기가 B 형 간염에 감염될 경우, 바이러스가
영원히 몸속에 남아 있을 가능성이 매우 큽니다.
바이러스가 장기간 몸속에 남아 있으면 영구 간
손상(간경변증) 등의 중대한 건강 문제가 생길 수
있습니다. B 형 간염은 치명적일 수 있는 간암의
주요 원인이기도 합니다. 그래서 어릴 때
예방접종을 맞는 것이 중요합니다.

태어날 때 B 형 간염 예방접종을 맞아야 할 아기는?

어머니가 B 형 간염 환자인 아기는 태어날 때
B 형 간염 예방접종을 맞습니다. 동거 가족 또는
보육자가 B 형 간염 환자인 아기도 태어날 때
B 형 간염 예방접종을 맞아야 합니다. 어떤
사람이 B 형 간염 감염 위험이 높은지
알아보려면 [HealthLinkBC File #25a B 형 간염
예방접종](#)을 참고하십시오.

아기가 태어날 때 B 형 간염으로부터 어떻게 보호되나?

산모가 B 형 간염에 감염되었거나 감염 위험이
있을 경우, 그 아기는 태어날 때 2종의
예방접종을 맞습니다. 하나는 B 형 간염
바이러스를 막아주는 항체를 즉시 제공하는 B 형
간염 면역글로불린, 다른 하나는 아기가 스스로
항체를 생산하도록 촉진하는 B 형 간염
예방접종입니다. 어머니는 감염되지 않았지만
동거 가족 또는 보육자가 B 형 간염 환자인
아기는 태어날 때 B 형 간염 예방접종만
맞습니다.

영유아는 생후 2개월, 4개월 및 6개월에 한 번씩
총 3회에 걸쳐 B 형 간염 예방접종이 투여됩니다.
이 예방접종은 다른 영유아 예방접종들과 동시에
투여됩니다. 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC
File #105 디프테리아, 파상풍, 백일해, B 형 간염,
소아마비 및 b 형 혜모필루스
인플루엔자\(DTaP-HB-IPV-Hib\) 백신](#)을
참고하십시오.

태어날 때 예방접종이 투여된 아기는 마지막
B 형 간염 예방접종 투여로부터 4주 후에
예방접종의 효과를 확인하는 혈액검사를 받아야
합니다.

태어날 때 B 형 간염 예방접종이 투여된 아기 중
몇몇은 다른 예방접종 계획이 적용될 수도
있습니다. 여러분 자녀가 언제 예방접종을
맞거나 검사를 받아야 하는지 불확실할 경우,
보건의료 서비스 제공자에게 문의하십시오. 모든
예방접종 기록을 잘 보관하는 것이 중요합니다.

B 형 간염 면역글로불린 도는 영유아 B 형 간염
예방접종에 관해 자세히 알아보려면
[HealthlinkBC File #25b B 형 간염 면역글로불린](#)
및 [HealthLinkBC File #25c B 형 간염 백신](#)을
참고하십시오.

B 형 간염 예방접종은 어떤 효과가 있나?

B 형 간염 예방접종은 B 형 간염 및 그 합병증(간암 및 사망의 원인이 될 수 있는 영구 간 손상 등)으로부터 자녀를 보호하는 최선책입니다.

자녀에게 예방접종을 맞히면 다른 사람들도 보호하는 것입니다.

접종 후 어떤 반응이 나타날 수 있나?

이 백신은 매우 안전합니다. B 형 간염에 걸리는 것보다 예방접종을 맞는 것이 훨씬 안전합니다.

이 백신에 대한 일반적 반응은 접종 부위의 통통, 발적, 부어오름 등입니다. 발열, 짜증, 피로감 등이 생기는 아동도 있습니다.

발열 또는 통통에는 아세트아미노펜(Tylenol® 등) 또는 이부프로펜*(Advil® 등)을 쓸 수 있습니다. 만 18 세 미만 아동/청소년은 라이증후군 위험이 있으므로 ASA(Aspirin® 등)를 복용하면 안됩니다.

*생후 6 개월 미만 영아에게는 보건의료 서비스 제공자와 상담하지 않고 이부프로펜을 먹이면 안됩니다.

라이증후군에 관해 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #84 라이증후군](#)을 참고하십시오.

그 확률이 백만 명 중 1 명 미만으로 극히 낮기는 하지만 ‘아나필락시스’라는 생명이 위험한 알레르기 반응이 나타날 수도 있으므로, 모든 예방접종은 맞은 후 15 분간 진료소에 머물러 있어야 합니다. 이 반응에는 두드러기, 호흡곤란, 목구멍/혀/입술 부어오름 등이 포함될 수 있습니다. 이런 반응이 나타날 경우, 보건의료 서비스 제공자가 즉시 적절한 처치를 할 수 있습니다. 응급 처치에는 에피네프린(아드레날린) 투여와 가까운 응급실로의 구급차 수송이 포함됩니다. 진료소에서 나온 후에 이런

증상이 나타날 경우에는 **9-1-1** 또는 거주지 관내 응급 전화번호로 전화하십시오.

심각하거나 예기치 않은 반응은 반드시 보건의료 서비스 제공자에게 알리십시오.

B 형 간염은 어떻게 전염되나?

B 형 간염은 감염된 혈액 및 몇몇 체액과의 접촉에 의해(예를 들어 출산 중에) 전염됩니다. 피 묻은 물품(칫솔, 면도기, 잇실, 손톱 다듬는 줄, 약물 주사에 사용된 주사 바늘 등)의 사용, 또는 B 형 간염 바이러스 감염자와의 보호책 없는 성관계에 의해 전염될 수도 있습니다.

B 형 간염에 걸린 사람과 같은 집에서 사는 사람은 감염 위험이 더 높기 때문에 B 형 간염 예방접종을 맞아야 합니다. 이런 사람에게는 예방접종이 무상으로 제공됩니다. 예방접종 예약을 하려면 보건의료 서비스 제공자에게 문의하십시오. B 형 간염에 관해 더 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #25a B 형 간염 예방접종](#)을 참고하십시오.

내가 B 형 간염에 걸렸을 경우 아기에게 젖을 먹여도 괜찮나?

예, 괜찮습니다. 젖꼭지가 갈라졌거나 출혈이 있지 않은 한, B 형 간염은 모유 수유에 의해 전염되지 않습니다.

자세히 알아보기

BC 주의 예방접종에 관해 자세히 알아보려면 <https://www.healthlinkbc.ca/health-library/immunizations/schedules>.



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority