

A 형 간염 예방접종 Hepatitis A Vaccine

자녀를 안전하게 지켜주십시오.
모든 예방접종을 제때 맞으십시오.

모든 예방접종을 제때 맞으면 평생 각종 질병으로부터 보호될 수 있습니다.

캐나다에서 예방접종은 지난 50 년간 다른 어느 보건 시책보다 많은 생명을 구했습니다.

A 형 간염 예방접종이란?

A 형 간염 예방접종은 A 형 간염 바이러스 감염을 예방해줍니다. 이 백신은 캐나다 보건부(Health Canada)가 승인한 것입니다.

접종 대상자는 누구인가?

A 형 간염 예방접종은 생후 6 개월 이상인 사람에게 2 회 투여됩니다. 2 차 접종은 1 차 접종일과 6 개월 이상 간격을 두고 투여됩니다.

BC 주에서는 지난 15 년 동안 원주민 사회에서 A 형 간염이 여러 번 돌발했기 때문에, 원주민 보호구역 내부 및 외부에 거주하는 원주민 아동에게 2012 년 1 월 1 일부터 A 형 간염 예방접종이 투여되었습니다.

A 형 간염 예방접종은 다음과 같이 감염 위험이 높은 사람에게는 무상으로 제공됩니다:

- 혈우병 환자, 또는 혈액/혈액제제가 반복적으로 투여되는 사람
- 불법 약물을 주사하거나, 약물 비강흡입/흡연/주사 기기를 공동 사용하는 사람
- 다른 남성과 성관계를 갖는 남성
- HIV, B 형 및 C 형 간염, 또는 만성 간질환 환자
- 줄기세포 이식을 받은 사람
- 간 이식 수술을 받았거나 받을 예정인 사람

- 교도소 재소자
- A 형 간염 바이러스에 감염된 사람과 밀접하게 접촉하는 사람 – 같은 집에 동거하는 사람, 성관계 상대, 친한 친구, 같은 탁아소에서 생활하는 아동 등
- A 형 간염에 걸린 식품취급자가 만든 음식을 먹은 사람
- 생후 6 개월부터 만 18 세까지의 원주민 아동 및 청소년 – 유아는 생후 6 개월에 1 차 접종, 생후 18 개월에 2 차 접종을 맞습니다. 더 큰 아동은 6 개월 이상의 간격을 두고 2 회 맞습니다.

A 형 간염에 노출되었을 가능성이 있을 경우, 노출 시점으로부터 14 일 이내에 예방접종을 1 회 맞아야 합니다. 무상으로 제공됩니다.

A 형 간염 바이러스와 접촉하거나 바이러스를 옮길 가능성이 있는 사람도 이 예방접종이 권장됩니다(무상으로 제공되지 않음):

- 개발도상국(특히 시골 지역) 거주자, 근무자 또는 여행자
- 식품취급자
- 성관계 상대가 2 명 이상인 사람
- 지속적인 A 형 간염 감염 문제가 있는 발달장애인을 위한 시설의 입주자 및 근무자
- 영장류를 다루는 동물원 사육사, 수의사 및 연구원
- A 형 간염 바이러스 연구, 또는 A 형 간염 백신 생산에 종사하는 사람

모든 예방접종 기록을 잘 보관하십시오.

A 형 간염 예방접종은 어떤 효과가 있나?

이 예방접종은 A 형 간염 감염에 대한 최선의 보호책입니다. 예방접종을 맞으면 다른 사람들도 보호하는 것입니다.

접종 후 어떤 반응이 나타날 수 있나?

모든 백신은 매우 안전합니다. A형 간염에 걸리는 것보다 예방접종을 맞는 것이 훨씬 안전합니다.

이 백신에 대한 일반적 반응은 접종 부위의 동통, 발적, 부어오름 등입니다. 두통, 피로, 발열, 배탈 등이 생길 수도 있습니다. 이런 반응은 모두 경미하며 일반적으로 1-2일 지속됩니다.

발열 또는 동통에는 아세트아미노펜(Tylenol® 등) 또는 이부프로펜*(Advil® 등)을 쓸 수 있습니다. 만 18세 미만 아동/청소년은 라이증후군 위험이 있으므로 ASA(Aspirin® 등)를 복용하면 안됩니다.

*생후 6개월 미만 영아에게는 보건의료 서비스 제공자와 상담하지 않고 이부프로펜을 먹이면 안됩니다.

라이증후군에 관해 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #84 라이증후군](#)을 참고하십시오.

그 확률이 백만 명 중 1명 미만으로 극히 낮기는 하지만 ‘아나필락시스’라는 생명이 위험한 알레르기 반응이 나타날 수도 있으므로, 모든 예방접종은 맞은 후 15분간 진료소에 머물러 있어야 합니다. 이 반응에는 두드러기, 호흡곤란, 목구멍/혀/입술 부어오름 등이 포함될 수 있습니다. 이런 반응이 나타날 경우, 보건의료 서비스 제공자가 즉시 적절한 처치를 할 수 있습니다. 응급 처치에는 에피네프린(아드레날린) 투여와 가까운 응급실로의 구급차 수송이 포함됩니다. 진료소에서 나온 후에 이런 증상이 나타날 경우에는 9-1-1 또는 거주지 관내 응급 전화번호로 전화하십시오.

심각하거나 예기치 않은 반응은 반드시 보건의료 서비스 제공자에게 알려십시오.

A형 간염 예방접종을 맞지 말아야 할 사람은?

과거에 A형 간염 백신, 백신의 성분(네오마이신 등), 또는 라텍스에 대해 생명이 위험한 반응이 나타난 적이 있을 경우, 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

감기 또는 기타 경미한 병 때문에 예방접종을 미룰 필요는 없지만, 걱정되는 것이 있을 경우 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

A형 간염이란?

A형 간염은 간을 공격하는 바이러스입니다. 증상은 피로, 발열, 구역 및 구토, 식욕부진, 복통, 어두운 색 소변, 탈색된 대변, 황달 등입니다. 증상이 전혀 나타나지 않는 사람도 있습니다(특히 유아). 감염자 1,000명 중 1-3명은 사망합니다. A형 간염으로 인한 사망 위험은 50세 이상의 연령층에서 더 높습니다.

A형 간염은 어떻게 전염되나?

A형 간염 바이러스는 감염자의 대변에서 발견됩니다. 화장실을 사용할 때 손을 잘 씻지 않는 A형 간염 감염자는 음식 조리, 또는 다른 손에서 입으로의 접촉을 통해 다른 사람에게 바이러스를 옮길 수 있습니다. 이 질병은 성적 접촉, 또는 불법 약물 사용에 사용되는 기구(주사바늘, 파이프 등)의 공동 사용에 의해 전염될 수도 있습니다.

또한, A형 간염은 오염된 물을 마시거나, 날것 또는 덜 익힌 패류(하수에 오염된 게, 조개, 굴, 홍합 등)를 먹을 때 전염될 수도 있습니다.

성숙한 미성년자의 동의

부모/후견인과 그 자녀는 예방접종 동의에 대해 상의하는 것이 바람직합니다. 만 19세 미만의 미성년자일지라도 백신의 효과와 가능한 반응, 그리고 예방접종을 맞지 않을 경우의 위험을 이해할 수 있다면 합법적으로 예방접종에 동의하거나 거부할 수 있습니다. 성숙한 미성년자의 동의에 관해 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #119 미성년자법, 성숙한 미성년자의 동의 및 예방접종을](#) 참고하십시오.

예방접종에 관해 자세히 알아보려면 <https://immunizebc.ca>에서 ‘ImmunizeBC’를 방문하십시오.

