

## 黃熱病疫苗 Yellow Fever Vaccine

我們建議到部分國家旅行或工作的人士進行旅行防疫接種。請確保在出行前至少 6 至 8 週，就您的旅行計劃諮詢公共衛生局、旅行診所或您的醫護人員。

大多數的旅行疫苗接種均不列入省醫療服務計劃 (MSP)，您應向當地的旅行診所查詢有關費用。

前往旅行診所時，請帶好您的疫苗接種記錄。進行旅行疫苗接種後，您應保存記錄，並在旅行時攜帶。

### 甚麼是黃熱病疫苗？

黃熱病是一種病毒性疾病，經由受感染的病蚊叮咬而傳播，黃熱病疫苗有助於預防該病毒。該疫苗已獲加拿大衛生部批准。

### 哪些人應接種疫苗？

前往非洲熱帶地區或中南美洲旅行或工作的人士，可能需接種該疫苗。請諮詢您的醫護人員或旅行診所，以瞭解詳情。

如需查閱卑詩省內黃熱病疫苗接種中心名單，請瀏覽加拿大公共衛生局網頁：

[www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html](http://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html)。

我們也建議經常接觸黃熱病病毒的工作人員（例如某些研究員和實驗室工作人員）接種黃熱病疫苗。

成人和年滿 9 個月的兒童可以接種該疫苗。該疫苗只需接種或注射一劑。

黃熱病疫苗能夠為 99% 的接種人群在 30 天內提供免疫保護。您應在接種疫苗後，再動身前往受黃熱病影響的地區。

接種一次黃熱病疫苗足以幫助您建立起終身的黃熱病免疫力，因此您無需接種加強劑。

接種該疫苗後，您會收到一份加蓋印章的《國際疫苗接種或預防證書》(International Certificate of Vaccination or Prophylaxis)。這是一份官方記錄，也是部分國家的法定入境文件。如果您因醫療原因不能接種黃熱病疫苗，需由醫護人員使用官方信箋出具書面文件，或由旅行診所出具《接種醫療禁忌證明》(Certificate of Medical Contraindication to Vaccination)。書面文件或證明必須說明不能接種疫苗的醫學原因。

如果沒有證明或醫生出具的書面文件，您可能被目的地國家拒絕入境，或要在目的地國家的入境口岸接種疫苗。部分國家的防疫接種條件可能欠佳。

### 接種該疫苗有哪些好處？

黃熱病毒感染是一種嚴重的疾病，有時甚至可能致命。接種黃熱病疫苗是預防此疾病的最佳途徑。

### 接種該疫苗後可能出現哪些反應？

疫苗非常安全，接種該疫苗遠比感染黃熱病更安全。對該疫苗的一般反應包括注射部位疼痛和紅腫，也有可能在接種疫苗的 5 至 10 天後出現為期 1 至 2 天的輕微頭痛、低燒或肌肉疼痛等症狀。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 Acetaminophen (例如泰諾 Tylenol®) 或布洛芬 ibuprofen\* (例如雅維 Advil®)。不應該給 18 歲以下人士服用乙酰水楊酸 ASA (例如阿司匹林 Aspirin®)，因為有造成雷伊氏綜合症 (Reye Syndrome) 的危險。

\*在事先沒有與醫護人員溝通的情況下，不應該給 6 個月以下的兒童服用布洛芬。

如要了解雷伊氏綜合症詳情，請參閱 [HealthLinkBC File #84 雷伊氏綜合症](#)。

進行任何免疫接種後，都必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在非常罕見的情況下（概率低於百萬分之一）可能會出現名為「全身過敏性反應」

(anaphylaxis) 的可致命反應，其症狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難，以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應，醫護人員會及時為您治療。緊急療法包括注射腎上腺素，以及由救護車將您就近送往醫院急症部。若您在離開診所後出現這些反應，請致電 **9-1-1** 或當地緊急救助電話。

謹記，如有任何嚴重或未曾預料到的反應，請告訴醫護人員。

## 哪些人不應接種該疫苗？

一般來說，以下人群不應接種黃熱病疫苗。不過，假如旅行無法避免，請與您的醫護人員探討接種黃熱病疫苗的利弊。

- 未滿 9 個月的嬰兒
- 60 歲及以上的人士
- 曾患胸腺疾病或失調症的人士，包括重症肌無力、胸腺瘤、胸腺切除或迪喬治綜合症 (DiGeorge syndrome)，因為他們在接種疫苗後發生多器官衰竭的風險較高，而目前尚不確知此類風險有多大

如果您有或曾出現以下反應或病症，請諮詢旅行診所或醫護人員：

- 曾因接種黃熱病疫苗、或對該疫苗中的任何成分（包括明膠）或乳膠出現過危及性命的過敏反應
- 對蛋嚴重過敏
- 因疾病或藥物治療導致免疫系統功能減退者
- 復發緩解型多發性硬化症 (MS)，接種黃熱病疫苗也許會使您的病情加重
- 因有症狀的愛滋病病毒感染/愛滋病或其它原因而導致的嚴重的免疫缺陷
- 您正處於孕期或哺乳期如遇黃熱病爆發，感染風險很高，您可能會破例被予以接種

## 甚麼是黃熱病？

黃熱病是由病毒引起的可危及生命的嚴重感染。病毒侵襲肝臟時，患者的皮膚和眼睛會變黃（即出現黃疸症狀），黃熱病因此得名。

每 10 名感染者中，可有多達 4 人因此死亡。

黃熱病的症狀包括突然發燒、畏寒、頭痛、背痛、全身肌肉疼痛、噁心和嘔吐，情況嚴重者會出現口鼻和腸道出血。患者亦可能出現肝腎衰竭。目前尚沒有藥物能夠治療這一疾病。

黃熱病病毒經由非洲熱帶地區和中南美洲的受感染病蚊叮咬而傳染至人，被加拿大的蚊子叮咬不會感染此疾病。不過，能夠傳播黃熱病病毒的蚊子物種，可以使病毒在雨林中的猴子之間、以及人與人之間傳播。如需瞭解有關預防蚊子叮咬的更多資訊，請參閱

[HealthLinkBC File #41f 瘧疾的預防](#)。

## 成熟未成年人同意接種疫苗

我們建議家長或監護人與子女先討論是否同意免疫接種。年齡未滿 19 歲的兒童，如能瞭解接種疫苗的好處、每種疫苗的可能反應，以及不接種疫苗的風險，可以就同意或拒絕免疫接種作出合法決定。若要瞭解更多有關成熟未成年人同意接種疫苗的資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #119 未成年人法案、成熟未成年人同意書及免疫接種](#)。