



肺炎球菌多糖體疫苗

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine

在加拿大，過去 50 年間，免疫接種比任何其他醫療手段挽救的生命都要多。

甚麼是肺炎球菌多糖體疫苗？

肺炎球菌多糖體疫苗可預防 23 種肺炎球菌。該疫苗已獲加拿大衛生部批准。

肺炎球菌多糖體疫苗並不屬於兒童常規接種疫苗。若要了解兒童常規肺炎球菌疫苗方面的更多资讯，請參閱 [HealthLinkBC File #62a 肺炎球菌結合 \(PCV13\) 疫苗](#)。

哪些人應接種疫苗？

有些人感染肺炎球菌致病的風險較高。此類人士可以免費接種該疫苗，他們包括：

- 65 歲及以上的老年人；以及
- 生活在家居關懷或生活協助設施內的任何年齡的居民。

出現以下病情的兩歲及以上人士也可免費接種該疫苗：

- 沒有脾臟或脾臟功能不全者；
- 患有鎌狀細胞疾病；
- 因疾病或醫療原因，免疫系統被削弱；
- 慢性肝病，包括肝硬化、慢性乙肝或丙肝；
- 慢性腎病；
- 慢性心臟或肺部疾病；
- 進行過胰島細胞或器官移植，或耳蝸（內耳）埋植，或正在等候進行這些手術；
- 進行過幹細胞移植；
- 糖尿病、囊胞性纖維症或慢性腦脊液泄漏；

- 酒精依賴；
- 無家可歸者；以及
- 使用非法藥品者，尤其是吸食霹靂可卡因者。

建議患有某些醫學病徵的患者接種^{第二}劑疫苗。請諮詢醫護人員，瞭解自己是否需要接種^{第二}劑疫苗以及應該何時接種。

請務必保存好所有的免疫接種紀錄，這很重要。

接種肺炎球菌多糖體疫苗的好處有哪些？

腦膜炎球菌感染是一種嚴重疾病，有時甚至可能致命。接種該疫苗是預防此類感染的最佳途徑。

您接種疫苗的同時，也保護了其他人。

接種該疫苗後可能出現哪些反應？

疫苗非常安全。接種該疫苗遠比患上肺炎球菌疾病更為安全。

對該疫苗的常見反應包括接種部位紅腫和疼痛。有些人也可能出現發燒。這些輕微反應通常可持續一到兩天。

如有發燒或酸痛，可服用醋氨酚 Acetaminophen (例如泰諾[®]) 或布洛芬 ibuprofen* (例如雅維 Advil[®])。不應該給 18 歲以下人士服用乙酰水楊酸 ASA (例如阿司匹林 Aspirin[®])，因為有造成雷伊氏綜合症 (Reye Syndrome) 的危險。

*在事先沒有與醫護人員溝通的情況下，不應該給 6 個月以下的兒童服用布洛芬。

如要了解雷伊氏綜合症詳情，請參閱 [HealthLinkBC File #84 雷伊氏綜合症](#)。

進行任何免疫接種後，都必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在罕見的情況下（概率低於百萬分之一）可能會出現名為「全身性過敏反應」（**anaphylaxis**）的可致命反應。其徵狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難，以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應，您的醫護人員可以為您治療。緊急療法包括注射腎上腺素，以及由救護車將您就近送往醫院急診部。如果在您離開診所後出現這些反應，請致電 **9-1-1** 或當地的緊急求助電話。

謹記，如有任何嚴重或未曾預料到的反應，請告訴醫護人員。

誰不應該接種肺炎球菌多糖體疫苗？

如果您曾對先前接種的肺炎球菌疫苗的劑量，或該疫苗的任何成分產生過危及生命的過敏反應，請與您的醫護人員商議。

兩歲以下的兒童不應接種肺炎球菌多糖體疫苗，因為該疫苗對幼童不起作用。兩歲以下兒童應在兩個月大時開始接種肺炎球菌結合型疫苗。

您無需因感冒或其它輕微疾病推遲疫苗接種。但是若有疑慮，請與醫護人員商議。

甚麼是肺炎球菌感染？

肺炎球菌感染係由肺炎鏈球菌引起的感染。這種病菌可以導致嚴重及危及生命的感染，例如腦膜炎（覆蓋大腦的內膜感染）、敗血症（血液感染）和肺炎（肺部感染）。

感染的永久性併發症包括腦部受損及失聰。在每 4 個感染肺炎球菌腦膜炎的人中，便有 1 個會因此死亡。

肺炎球菌感染可經由咳嗽、打噴嚏或近距離的面對面接觸而在人與人之間傳播，也可經由唾液傳播。通過以下活動可發生唾液傳染，例如接吻或共享食物、飲料、香烟、口紅、水瓶、體育比賽中的護牙套或樂器的吹口。

成熟未成年人同意接種疫苗

我們建議家長或監護人與子女先討論是否同意免疫接種。年齡未滿 19 歲的兒童，如能了解接種疫苗的好處、每種疫苗的可能反應，以及不接種疫苗的風險，可以就同意或拒絕免疫接種作出合法決定。若要了解更多有關成熟未成年人同意接種疫苗的資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #119 未成年人法案、成熟未成年人同意書及免疫接種](#)。

如需瞭解更多疫苗注射的資訊，請訪問卑詩省免疫接種（**Immunize BC**）網站：
<https://immunizebc.ca/>。



如需查找有關更多話題的HealthLinkBC文檔，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 網頁，或訪問您當地的公共衛生單位。如需在卑詩省內獲取非緊急健康資訊和建議，請訪問 www.HealthLinkBC.ca，或致電 **8-1-1**（免費電話）。失聰和弱聽人士如需協助，請致電 **7-1-1**。若您需要，我們亦可提供130多種語言的翻譯服務。