



ਟੈਕਸਿਕ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਡਰੋਮ Toxic Shock Syndrome

ਟੈਕਸਿਕ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਕਸਿਕ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (TSS) ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। TSS ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਜ਼ਹਿਰ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ TSS ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ TSS ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਪੋਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। TSS ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ TSS ਹੈ, ਤਾਂ **9-1-1** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

TSS ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

TSS ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ TSS ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ:

- ਸਟੈਫਿਲੋਕਸ ਅੰਗੀਅਸ (SA) (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੈਫ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
- ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ (GAS)

ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, [HealthLinkBC File #106 ਗਰੁੱਪ ਏ. ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇਖੋ।](#)

ਸਟੈਫਿਲੋਕਾਕਸ ਅੰਗੀਅਸ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਨੱਕ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, SA ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ TSS ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। SA ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TSS ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜ਼ਖਮ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। TSS ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

TSS ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

TSS ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬੋਹੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਸਨਬਰਨ ਵਰਗੇ ਪੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, TSS ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੋਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ TSS ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਟੈਕਸਿਕ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ TSS ਹੈ, ਤਾਂ **9-1-1** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪੋਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਾਮੇਂ TSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਪੋਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪੋਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

TSS ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

TSS ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ TSS ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਟੈਪੋਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਪੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TSS ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

ਸਟੈਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ TSS ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ TSS ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

TSS ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- SA ਟੈਂਕਸਿਕ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਟੈਪੋਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੋਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ
- ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਪੰਜ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਯੂਟਰਾਈਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਯੋਨੀ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਜ਼ੀਨਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸਾੜ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਸਮੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SA ਜ਼ੋਖਮ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸਾੜ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਸਮੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SA ਜ਼ੋਖਮ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਹਾਲੀਆ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ (ਫੈਰਨਜਾਈਟਿਸ), ਲੈਰਿਨਜਾਈਟਿਸ, ਟੋਨਸਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ

ਭਾਵੇਂ ਟੈਪੋਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ TSS ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਪੋਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ TSS ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਕੀ TSS ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

TSS ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲਣ, ਜ਼ਖਮਾਂ, ਖਰੋਂਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਕੀਡੇ-ਮਕੌਝਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਾਡ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪੋਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ, ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਪਸ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TSS ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਪੈਕੇਜ ਇਨਸਰਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ
- ਟੈਪੋਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਪੰਜ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
- ਆਪਣੇ ਟੈਪੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਟੈਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
- ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਪੋਨ/ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪਹਿਨਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਡ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੈਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਸੋਸ਼ਕ ਟੈਪੋਨ ਨਾਲ TSS ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਪੰਜ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਛੱਡੋ



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

ਹੈਲਥਲਿੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ **8-1-1** (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।