



La syphilis

Syphilis

Qu'est-ce que la syphilis?

La syphilis est une infection bactérienne. L'infection comporte quatre stades : primaire, secondaire, latent précoce et latent tardif.

Comment contracte-t-on la syphilis?

Vous pouvez contracter la syphilis par un contact étroit ou sexuel avec une autre personne infectée. La syphilis se propage par :

- Un contact de peau à peau avec un chancre syphilitique (lésion) ou une éruption cutanée. Cela peut survenir à l'occasion d'un contact externe ou interne avec la bouche d'une personne, ses organes génitaux ou son rectum qui arborent un chancre ou une éruption
- Un échange de fluides corporels, tels que du sang, du sperme ou des sécrétions vaginales
- L'échange d'accessoires sexuels

Si vous êtes enceinte et que vous êtes infectée, vous pouvez transmettre l'infection à votre bébé pendant la grossesse ou lors de la naissance.

Si n'importe qui peut contracter la syphilis, la majorité des personnes chez qui l'on a diagnostiqué la syphilis en Colombie-Britannique sont des hommes qui se définissent comme gais ou bisexuels, ou des hommes qui ont des relations homosexuelles (gbHARSAH). Les taux de syphilis ont augmenté considérablement en ce qui concerne les hommes qui ont des relations homosexuelles.

La syphilis peut se transmettre durant n'importe lequel des quatre stades de l'infection. Si vous êtes déjà atteint d'une autre infection transmissible sexuellement (ITS), votre risque de contracter la syphilis est plus élevé.

Quels sont les symptômes?

Chaque stade de la syphilis comporte une série distincte de symptômes. Les symptômes peuvent être si légers ou varier, tant et si bien qu'il se peut que vous ignoriez même souffrir de la syphilis.

Stade primaire

Au cours du stade primaire, une plaie indolore peut apparaître à n'importe quel endroit de votre corps qui est entré en contact avec une personne atteinte de syphilis. Elle apparaît généralement entre 3 et 90 jours après l'infection. Parfois, la plaie ne sera pas visible sur votre corps. Elle disparaîtra d'elle-même après quelques semaines, mais la maladie continuera son œuvre.

Stade secondaire

Le stade secondaire se déclare habituellement de 14 à 90 jours environ après l'infection. Au cours de ce stade, une éruption non prurigineuse peut apparaître. L'éruption peut apparaître n'importe où sur le corps, mais on la retrouve le plus souvent sur la poitrine, le ventre, les organes génitaux, la paume des mains et la plante des pieds. Vous pouvez ne pas remarquer l'éruption, mais vous pouvez quand même contribuer à propager la maladie. L'éruption disparaît habituellement, mais elle peut resurgir quelques mois plus tard. D'autres symptômes peuvent comprendre des maux de tête, de la fièvre, la perte de cheveux, la présence de ganglions enflés et des bosses ou des plaques muqueuses dans la bouche, sur l'anus, sur le pénis ou dans le vagin.

Stades latents

Une fois l'éruption disparue, si la maladie n'a pas été traitée, elle progressera aux stades de latence, ou stades cachés. La période de latence peut durer jusqu'à 30 ans, voire plus longtemps. Vous pourriez ne pas présenter de symptômes pendant cette période.

Il existe deux stades latents de la syphilis :

- Le stade latent précoce est lorsque la personne a contracté la syphilis au cours de l'année. Les personnes à ce stade « précoce » peuvent plus facilement propager l'infection
- Le stade latent tardif est lorsqu'une personne est atteinte de syphilis depuis plus d'un an

Comment vous faire tester pour la syphilis

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour vous faire tester si vous présentez un ou

l'autre symptôme de la syphilis, comme des plaies ou des éruptions cutanées. Votre fournisseur de soins de santé pourra vous fournir une recommandation pour une prise de sang et des analyses de laboratoire.

Il est recommandé aux hommes qui ont des relations homosexuelles ainsi qu'à toute personne qui a de multiples partenaires sexuels de subir des tests pour la syphilis tous les trois à six mois, ou immédiatement si vous présentez des symptômes.

Il est recommandé aux femmes enceintes de se faire tester pour la syphilis dans le cadre d'un dépistage prénatal. Si vous êtes enceinte, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour en savoir plus sur vos risques de contracter une ITS, y compris la syphilis. Il pourra déterminer si vous avez besoin d'un dépistage des ITS.

Vous pouvez obtenir des tests directement dans certains laboratoires en Colombie-Britannique. Afin de trouver la clinique de dépistage la plus proche ou d'obtenir un test en ligne, consultez Smart Sex Resource, à l'adresse <https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it> (en anglais seulement) ou Get Checked Online, à l'adresse www.getcheckedonline.com (en anglais seulement).

Quelles sont les complications possibles?

Si vous ne recevez aucun traitement contre la syphilis, des complications peuvent survenir tôt après l'infection ou des années plus tard. Les complications peuvent être d'ordre neurologique (comme une perte de la vision ou de l'audition, ou des étourdissements) ou physique, comme des dommages au cerveau, au cœur et à d'autres organes qui peuvent être mortels.

La syphilis non traitée chez une femme enceinte peut causer des complications, comme une fausse couche, une naissance prématurée ou celle d'un mort-né, un faible poids à la naissance ou une syphilis congénitale (bébé né avec la syphilis).

Quel est le traitement?

À n'importe quel stade de la maladie, la syphilis peut être traitée avec des antibiotiques. Le traitement antibiotique ne peut pas éliminer les dommages causés par la maladie au stade latent tardif, mais il peut en prévenir d'autres. Votre formule sanguine selon des analyses devra confirmer le succès du traitement, une fois terminé.

Vos partenaires sexuels des deux derniers mois doivent faire l'objet d'un test et d'un traitement contre la syphilis. Cela dépendra du stade de syphilis que l'on vous diagnostiquera. Il est recommandé de ne pas avoir de relations sexuelles deux semaines après la fin de votre traitement et de celui de votre partenaire, et tant que la réussite du traitement ne sera pas confirmée.

La pilule contraceptive est-elle efficace en cas de prise d'antibiotiques?

Il y a très peu de preuves qui démontrent que la prise d'antibiotiques réduise à un certain point le bon fonctionnement de la contraception hormonale, qu'on retrouve sous forme notamment de pilule contraceptive, de timbre contraceptif, d'anneau vaginal ou d'injection contraceptive. Si vous êtes actuellement sous traitement aux antibiotiques, il est important de continuer à utiliser votre moyen de contraception comme vous le feriez normalement. Si vous avez des préoccupations, utilisez également des condoms jusqu'à vos prochaines règles après le traitement antibiotique ou adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé.

Obtenir de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements sur la façon de réduire votre risque de contracter une ITS, consultez [HealthLinkBC File n° 08o La prévention des infections transmissibles sexuellement \(ITS\)](#).



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ou votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.