



## 新冠（COVID-19）蛋白亚单位疫苗 COVID-19 Protein Subunit Vaccine

过去五十年间，免疫接种在加拿大比任何其他医疗手段挽救的生命更多。

### 新冠蛋白亚单位疫苗是什么？

新冠蛋白亚单位疫苗（Novavax）能防护可引致新冠的严重急性呼吸道综合征冠状病毒（SARS-CoV-2）所引发的感染。疫苗可帮助人体产生抗体，预防接种者在接触病毒后生病。这类疫苗均已获加拿大卫生部批准。

### 哪些人士应接种该疫苗？

蛋白亚单位疫苗已获批准用于年满 12 岁的人士。包括如何登记接种该疫苗在内的更多信息，请见卑诗省政府网站：

[www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/sc/immunization](http://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/sc/immunization)。

如您已感染新冠或可能曾经感染，仍建议您接种疫苗。因为您可能对能引起新冠的病毒和 / 或变种尚无免疫力，存在再次感染的风险。

### 如何接种该疫苗？

该疫苗需通过注射接种两剂。对于免疫系统较弱的人士，建议额外注射一剂疫苗，因为他们可能未能对疫苗产生强烈的免疫反应。有关哪些人士应该接种额外疫苗剂的信息，请见卑诗省政府网站：

[www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/sc/immunization](http://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/sc/immunization)。

政府目前正在向符合条件的已完整接种系列疫苗的人士提供新冠疫苗加强剂，以加强并延长疫苗防护效果。蛋白亚单位疫苗如用作加强剂，目前只获批准用于年满 18 岁的人士。有关新冠疫苗加强剂的更多信息，请见：

[www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/sc/booster](http://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/sc/booster)。

按照建议接种每一剂疫苗能够使您得到对新冠的最佳防护。

请保存好所有的免疫接种记录，接种下一剂时，务必将其随身携带。

### 接种疫苗后有哪些注意事项？

接种后，请继续遵守公共卫生部门的防疫建议，例如：勤洗手或使用搓手液，保持身体距离并佩戴口罩。

### 接种该疫苗有哪些好处？

新冠感染是一种严重疾病，有时甚至可能致命。接种该疫苗是预防此类感染的最佳途径。在临床试验中，接种了蛋白亚单位疫苗者感染新冠的几率下降了 90%。与其他加拿大已批准使用的新冠疫苗相比，新冠 mRNA 疫苗（莫德纳和辉瑞）可提供更佳的保护作用。您接种疫苗的同时，也等于保护了其他人，包括尚未接种和无法接种疫苗者。

### 接种疫苗后可能出现哪些反应？

疫苗非常安全。接种该疫苗远比感染新冠来得安全。该疫苗不是活体病毒疫苗，不会让您感染新冠。接种此疫苗常见的反应包括接种部位触痛、酸痛、发红和肿胀，其他反应包括疲乏、头痛、发烧、肌肉或关节痛、恶心和呕吐。这些反应通常很轻微，且只持续一到两天。如对接种疫苗后的症状心存疑虑，请咨询医护人员或拨打 **8-1-1** 寻求建议。

有数起在接种蛋白亚单位疫苗后出现心脏炎（心肌炎和心包炎）的罕见报告，主要发生在 12 至 39 岁的男性中。接种蛋白亚单位疫苗后发生心肌炎的概率目前尚不清楚。

如有发烧或疼痛，可服用醋氨酚 Acetaminophen（如：泰诺 Tylenol®）或布洛芬 ibuprofen（如：雅维 Advil®）。由于存在雷伊氏综合征风险，18岁以下人士不宜服用乙酰水杨酸 ASA（如阿司匹林 Aspirin®）。

如要了解雷伊氏综合症详情，请参阅 [HealthLinkBC File #84 雷伊氏综合征](#)。

进行任何免疫接种后，都必须在诊所内停留 15 分钟，因为在非常罕见的情况下（概率约百万分之一）可能会出现名为“全身过敏性反应”（anaphylaxis）的致命性过敏反应，其症状可能包括荨麻疹、呼吸困难，以及喉咙、舌头或嘴唇肿胀。如果发生这一反应，您的医护人员可以为您治疗。紧急疗法包括注射肾上腺素，以及由救护车将您就近送往医院急诊部。若您在离开诊所后出现这些反应，请致电 **9-1-1** 或拨打当地紧急救助电话。

如有任何严重或未曾预料到的反应，请告诉医护人员。

### 哪些人不应接种疫苗？

对疫苗成分中的聚山梨酯 80 严重过敏（出现过敏性休克）的人群不应接种该疫苗。医疗药剂（如维生素油、锭剂和抗癌药物）和化妆品中也含有该成分。

如果您曾在接种新冠疫苗后出现过敏性休克，或曾出现原因不明的过敏性休克，请告知您的医护人员。

### 接种疫苗时是否有其他考虑事项？

如果您有以下情况，请向医护人员咨询：

- 在接种任意一剂新冠苗后，经医生确诊患有心脏炎症（心肌炎或心包炎），而且没有找到其他导致此病的原因
- 曾在感染新冠后出现过多系统炎症综合征
- 出现新冠症状

如您有新发疾病且妨碍到日常活动，应等待直至好转再接种。这有助于辨别是疫苗产生副作用还是既有疾病恶化。

### 什么是新冠？

新冠是一种由 SARS-CoV-2 冠状病毒引发的呼吸道和肺部感染疾病。新冠症状包括咳嗽、气短、发烧、寒颤、疲乏、丧失嗅觉和味觉。部分受感染者也许不会出现症状，或只有轻微症状，其他患者则需住院甚至可能死亡。长者及患有糖尿病、心脏病或肺病等慢性病的患者在感染新冠后更容易出现严重病症。新冠的症状可能持续数周甚至更久。新冠对患者健康的长期影响仍待研究。

### 新冠如何传播？

新冠病毒可经由咳嗽、打喷嚏、近距离交谈和唱歌而在人际间传播。触摸了带有新冠病毒的物体或表面后，未洗手就碰触口鼻或眼睛也会传播病毒。

更多有关新冠疫苗的信息，请浏览 BCCDC 的新冠疫苗接种网页：[www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine](http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine)。



如需更多有关 HealthLinkBC 分类主题的文档，请浏览 [www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files](http://www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files) 或咨询当地的公共卫生部门。如需在获取有关卑诗省的非紧急健康信息和建议，请浏览 [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) 或致电 **8-1-1**（免费电话）。失聪和听障人士，请致电 **7-1-1**。若您需要，我们可提供 130 多种语言的翻译服务。