Korean - Number 124c
October 2026

COVID-19 단백질 아단위 백신
COVID-19 protein subunit vaccine

캐나다에서 예방접종은 지난 50년간 다른 어느 보건 시책보다 더 많은 생명을 구했습니다.

COVID-19 단백질 아단위 백신이란?

COVID-19 단백질 아단위 백신(Nuvaxovid®)은 COVID-19를 유발하는 중증급성호흡기증후군 코로나바이러스 2(SARS-CoV-2) 감염을 예방합니다. 이 백신은 캐나다 보건부(Health Canada)가 승인한 것입니다.

접종 대상자는 누구인가?

단백질 아단위 백신은 12세 이상에게 사용하도록 승인되었습니다. 백신 요청 방법을 포함한 더 자세한 내용은 BC주 정부 웹사이트에서 찾아볼 수 있습니다:www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/immunizations/covid-19-immunization.

백신을 투여 방법은?

이 백신은 주사로 투여합니다. 12세 이상자는 1회 맞아야 합니다. 면역 체계가 약화된 경우, 예방접종 이력에 따라 1회 이상 접종이 필요할 수 있습니다.

모든 예방접종 기록을 잘 보관하는 것이 중요합니다.

백신의 효과는 무엇인가?

예방접종은 심각하고 때로는 치명적일 수 있는 질병인 COVID-19를 예방하는 가장 좋은 방법입니다. 이 백신은 입원 및 사망을 포함한 중증 COVID-19에 대해 강력한 예방 효과를 제공합니다. 여러분이 예방접종을 맞으면 예방접종을 맞을 수 없는 사람을 포함하여 다른 사람들도 보호하는 것입니다.

접종 후 어떤 반응이 나타날 수 있나?

백신은 매우 안전합니다. COVID-19에 걸리는 것보다 예방접종을 맞는 것이 훨씬 더 안전합니다. 백신의 일반적인 반응으로는 접종 부위의 압통, 통증, 발적 및 부기가 나타날 수 있습니다. 다른 부작용으로는 피로, 두통, 발열, 근육통 또는 관절통, 메스꺼움 및 구토가 나타날 수 있습니다. 이런 반응은 경미하며 보통 1~2일간 지속될 수 있습니다. 단백질 아단위 백신 접종 후 드물게 심장 염증(심근염 및 심낭염) 사례가 보고되었습니다.

> 발열 또는 동통에는 아세트아미노펜(Tylenol® 등) 또는 이부프로펜*(Advil® 등)을 쓸 수 있습니다. 18세 미만 아동/청소년은 라이증후군 위험이 있으므로 ASA(Aspirin® 등)를 복용하면 안 됩니다.

라이증후군에 관해 자세히 알아보려면 HealthLinkBC File #84 라이증후군을 읽어보십시오.

모든 예방접종은 맞은 후 15분간 진료소에 머물러 있어야 합니다. 그 확률이 극히 낮지만 '아나필락시스'라는 생명을 위협하는 알레르기 반응이 발생할 수 있기 때문입니다. 이 알레르기 반응은 예방접종자 백만 명 중 1명 미만 꼴로 나타납니다. 증상은 두드러기, 호흡곤란, 목구멍/혀/입술 부어오름 등입니다. 이런 반응이 나타날 경우, 보건의료 서비스 제공자가 적절히 처치할 수 있습니다. 응급 처치에는 에피네프린(아드레날린) 투여와 가까운 응급실로의 구급차 수송이 포함됩니다. 진료소에서 나온 후에 이러한 증상이 나타날 경우, **9-1-1** 또는 거주지 관내 응급 전화번호로 전화하십시오.

심각하거나 예기치 않은 반응은 반드시 보건의료 서비스 제공자에게 알리십시오.

예방접종을 맞지 말아야 할 사람은?

백신에 함유된 폴리소르베이트 80에 심각한 알레르기(아나필락시스)가 있는 경우, 이 백신을 접종받아서는 안 됩니다. 이 성분은 일부 의약품(예: 비타민 오일, 정제 및 항암제)과 화장품에도 함유되어 있습니다.

이전에 COVID-19 예방접종을 맞은 후 아나필락시스가 나타난 적이 있거나, 밝혀지지 않은 원인으로 아나필락시스가 나타난 적이 있을 경우, 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

감기 또는 기타 경미한 질병 때문에 예방접종을 미룰 필요는 없지만, 걱정되는 것이 있을 경우에는 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

백신 접종 시 고려해야 할 다른 사항이 있나요?

다음과 같은 경우에는 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오:

- 이전 COVID-19 백신 접종 후 다른 원인이 확인되지 않은 상태에서 의사로부터 심장 염증(심근염 또는 심낭염)을 진단받은 경우
- COVID-19 예방접종 후 다기관염증증후군에 걸린 병력이 있을 경우

COVID-19란?

COVID-19는 SARS-CoV-2 코로나바이러스가 일으키는 기도 및 폐 감염입니다. COVID-19의 증상에는 기침, 숨참, 발열, 오한, 피로감, 후각 또는 미각 상실 등이 포함될 수 있습니다. COVID-19에 감염되었음에도 아무 증상도 나타나지 않거나 증상이 경미한 사람도 있고, 병원에 입원하거나 사망하는 사람도 있습니다. 중증 질환은 고령자와 면역 체계가 매우 약한 사람에게 더 흔하게 발생합니다. COVID-19 증상이 몇 주 또는 더 오래 지속되는 경우도 있습니다. COVID-19가 건강에 끼치는 장기적 영향은 알려져 있지 않습니다.

COVID-19는 어떻게 전파되나?

COVID-19를 일으키는 바이러스는 기침, 재채기, 대화, 노래 부르기, 호흡 등에 의해 사람 사이에 전파됩니다. 바이러스가 붙은 사물 또는 표면을 만진 손으로 눈, 코 또는 입을 만질 때 전염될 수도 있습니다.

성숙한 미성년자의 동의

부모/후견인과 그 자녀는 예방접종 동의에 대해 상의하는 것이 바람직합니다. 만 19세 미만의 미성년자일지라도 각 백신의 이점과이상 반응, 미접종 시 따르는 위험을 이해할 수 있다면 법적으로 예방접종에 동의하거나 거부할 수 있습니다. 성숙한 미성년자의 동의에 관해 자세히 알아보려면 HealthLinkBC File #119 미성년자법(Infants Act) - 성숙한 미성년자의 동의 및 예방접종을 읽어보십시오.

MÉTIS NATION BRITISH COLUMBIA

First Nations Health Authority
Health through wellness

BCAAFC | BC Association of Aboriginal Friendship Centres

BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority