

لقاح شلل الأطفال (IPV) Polio vaccine (IPV)

يمكن أيضاً إعطاء سلسلة من لقاح شلل الأطفال المعطل للرضع والأطفال الذين يحتاجون فقط إلى الحماية من شلل الأطفال.

خلال الخمسين عامًا الماضية، أنقذ التطعيم في كندا أرواحًا أكثر من أي إجراء آخر.

ما فوائد اللقاح؟

يُعد لقاح شلل الأطفال أفضل وسيلة للحماية من شلل الأطفال، وهو مرض خطير ومميت في بعض الأحيان. عندما تتلقَى اللقاح، فإنك تُساعد بذلك في حماية الآخرين أيضًا.

ما التفاعلات المحتملة بعد تلقي اللقاح؟

اللقاحات آمنة جدًا. إن الحصول على اللقاح أكثر أمانًا بكثير من الإصابة بشلل الأطفال.

يُمكن أن تتضمن التفاعلات الشائعة للقاح وجود ألم، واحمرار وانتفاخ في مكان تلقي اللقاح. وقد تحدث كذلك إصابة بالحمى.

يمكن إعطاء الأستيامينوفين (مثل تايلينول®) أو الأيبوبروفين* (مثل أدفيل®) لتخفيف الحمى أو الألم. لا ينبغي إعطاء حمض الأسيتيل ساليسيليك ASA (كالأسبرين®) لمن هم دون سن الـ 18 لخطورة الإصابة بمتلازمة راي.

*لا ينبغي إعطاء آيبوبروفين للأطفال دون سن 6 أشهر قبل التحدث أولاً إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

لمزيد من المعلومات حول متلازمة راي، يرجى زيارة [ملف HealthLinkBC رقم 84 - متلازمة راي](#).

من المهم البقاء في العيادة لمدة 15 دقيقة بعد تلقي اللقاح. هناك احتمال نادر للغاية لحدوث تفاعل تحسسي مهدد للحياة يُعرف بالتأق. يحدث ذلك لدى أقل من واحد من كل مليون شخص يحصلون على اللقاح. قد تشمل الأعراض حدوث شرى (أرتكاريًا)، أو صعوبة في التنفس، أو تورم في الحنجرة أو اللسان أو الشفتين. إذا حدث هذا التفاعل، فإن مقدم الرعاية الصحية المتابع لك مستعد لعلاجها. يتضمن العلاج الطارئ إعطاء الإبينفرين (الأدرينالين)، والنقل بسيارة الإسعاف إلى أقرب قسم للطوارئ. إذا ظهرت الأعراض بعد مغادرة العيادة، اتصل على الرقم 1-1-9 أو برقم قسم الطوارئ المحلي.

يجب أن تُبلغ مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بالتفاعلات الخطيرة أو غير المتوقعة دائمًا.

ما هو لقاح شلل الأطفال (IPV)؟

يوفر لقاح شلل الأطفال الحماية من العدوى بجميع أنواع فيروس شلل الأطفال الثلاثة. اللقاح، المسمى لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV)، معتمد لدى وزارة الصحة الكندية.

من الذي ينبغي عليه تلقي اللقاح؟

يُعطى لقاح شلل الأطفال المعطل في الغالب كجرعة معززة للبالغين الذين تلقوا سلسلة من لقاحات شلل الأطفال في مرحلة الطفولة والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس شلل الأطفال. تشمل أمثلة البالغين المعرضين لخطر متزايد ما يلي:

- الأشخاص الذين سيعملون أو يسافرون في منطقة من العالم لا يزال شلل الأطفال موجودًا فيها
- العاملون في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم العاملون في المختبرات، الذين قد يتعرضون للبراز البشري.

ينبغي أيضًا على الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيمًا والذين قد يتعرضون لفيروس شلل الأطفال، على سبيل المثال من خلال العمل أو السفر، الحصول على اللقاح. هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى 3 جرعات من اللقاح. تُعطى الجرعتين الأوليين بفارق زمني يتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع. تُعطى الجرعة الثالثة بعد 6 إلى 12 شهرًا من الجرعة الثانية.

في الأطفال الصغار، يتم الجمع بين التطعيم ضد شلل الأطفال ولقاحات أخرى، مثل الخناق والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد B والمستدمية النزلية من النوع (Hib b).

لمزيد من المعلومات حول اللقاحات المركبة، تفضل بزيارة:

- [ملف HealthLinkBC رقم 15 لقاح الخناق \(الدفتيريا\) والكزاز \(التيتانوس\) والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع b \(DTaP-IPV-Hib\)](#)
- [ملف HealthLinkBC رقم 105 لقاح الخناق \(الدفتيريا\) والكزاز \(التيتانوس\) والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي من النوع B وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع b \(DTaP-HB-IPV-Hib\)](#)

من الذي ينبغي عليه عدم تلقي اللقاح؟

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا كنت أنت أو طفلك قد تعرضتما لرد فعل يهدد الحياة نتيجة جرعة سابقة من أي لقاح لشلل الأطفال أو أي جزء من اللقاح، بما في ذلك النيوميسين أو الستربتومايسين أو البوليميكسين ب.

لا حاجة لتأخير تلقي اللقاح بسبب الإصابة بالزكام أو أمراض بسيطة أخرى. ولكن إن كانت لديك مخاوف فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

ما هو شلل الأطفال؟

شلل الأطفال هو مرض يسببه فيروس شلل الأطفال. في حين أن معظم حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال لا تظهر عليها أعراض، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى شلل في الذراعين أو الساقين وحتى الموت. يحدث الشلل لدى حوالي شخص واحد من بين كل 200 شخص يصابون بالعدوى.

يمكن أن ينتشر شلل الأطفال عن طريق ملامسة براز شخص مصاب. يمكن أن يحدث هذا عن طريق تناول طعام أو شرب ماء ملوث بالبراز.

بفضل التطعيم، تم القضاء على شلل الأطفال في معظم أنحاء العالم. ولكن، إلى أن يتم القضاء على شلل الأطفال عالميًا، فإن التطعيم هو أفضل وسيلة للحماية.

موافقة القاصر الناضج

يُنصح بأن يناقش الأهالي أو أولياء الأمور أطفالهم حول الموافقة على التطعيم. يمكن للأطفال دون سن 19 عامًا، القادرين على فهم فوائد كل لقاح وتفاعلاته المحتملة ومخاطر عدم التطعيم، أن يوافقوا قانونيًا على التطعيم أو يرفضوه. لمزيد من المعلومات حول موافقة القاصر الناضج، يمكنك زيارة [ملف](#) [HealthLinkBC رقم 119: قانون الرضع، موافقة القاصر الناضج والتطعيم.](#)



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

لمزيد من مواضيع HealthLinkBC تفضل بزيارة www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files أو وحدة الصحة العامة المحلية في منطقتك. للحصول على المشورة ومعلومات صحية حول الحالات غير الطارئة في مقاطعة بريتيش كولومبيا تفضل بزيارة www.HealthLinkBC.ca أو اتصل بالرقم 1-8-1 (مجانيًا). للسمع وضعاف السمع، يرجى الاتصال بالرقم 1-7-1. تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من 130 لغة عند الطلب.