

丙型脑膜炎双球菌（Men-C）结合疫苗 Meningococcal C Conjugate (Men-C) Vaccine

保护您孩子的健康，
让他们按时接种疫苗。

若您的孩子能够按时接种所有疫苗，他们便能
终身避免许多疾病的威胁。

过去五十年间，免疫接种在加拿大挽救的生命比其他任何医疗手段都要多。

什么是 Men-C 疫苗？

Men-C 疫苗可以防止最常见的脑膜炎双球菌类型之一——丙型所引起的感染。该疫苗已获得加拿大卫生部批准。

Men-C 疫苗是作为您孩子常规免疫接种的一部分免费提供的。请联系您的医护人员，安排接种。

哪些人士应接种 Men-C 疫苗？

婴幼儿需接种两剂 Men-C 疫苗。第一剂在宝宝 2 个月时接种，第二剂在 12 个月时接种。该疫苗与其他儿童期疫苗一起接种。

Men-C 疫苗	儿童接种年龄
第 1 剂	2 个月
第 2 剂	12 个月

该疫苗也适用于以下群体：

- 2002 年以前出生、24 岁及以下且在其 10 岁生日或之后没有接种过该疫苗的人士
- 曾与丙型脑膜炎双球菌感染者有过密切接触的人

请务必保存好所有免疫接种记录。

接种此疫苗有哪些好处？

丙型脑膜炎双球菌感染是一种严重的疾病，有时甚至会致命。接种该疫苗是预防此类感染的最佳途径。

您为孩子接种疫苗的同时，也帮助保护了其他人。

接种该疫苗后可能出现哪些反应？

疫苗非常安全。接种该疫苗远比患上脑膜炎双球菌疾病来得安全。接种该疫苗后的常见反应可能有注射部位疼痛、红肿。接种疫苗后 24 小时内还可能出现发烧、嗜睡、暴躁、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、头痛或肌肉酸痛。这些症状一般都比较轻微，通常只会持续 1 至 2 天。

如有发烧或疼痛，可服用醋氨酚 Acetaminophen（如：泰诺 Tylenol®）或布洛芬 ibuprofen（如：雅维 Advil®）。由于存在雷伊氏综合征风险，18 岁以下人士不宜服用乙酰水杨酸 ASA（如阿司匹林 Aspirin®）。

*在事先没有与医护人员沟通的情况下，不应该给 6 个月以下的儿童服用布洛芬。

如要了解雷伊氏综合征详情，请参阅 [HealthLinkBC File #84 雷伊氏综合征](#)。

接种任何疫苗后，您都必须留在诊所内观察 15 分钟，因为在极其罕见的情况下（概率低于百万分之一）会出现一种危及生命的“全身型过敏反应”（anaphylaxis），其症状可能包括荨麻疹、呼吸困难，以及喉咙、舌头或嘴唇肿胀。如果发生这一反应，医护人员会及时为您治疗。紧急疗法包括注射肾上腺素，以及由救护车将您就近送往医院急诊部。若您在离开诊所后出

现这些反应，请致电 **9-1-1** 或拨打当地紧急救助电话。

如有任何严重或未曾预料到的反应，请告知医护人员。

哪些人士不应接种 Men-C 疫苗？

如果您的孩子曾因接种脑膜炎疫苗或对该疫苗中的任何成分出现过危及生命的反应，请告知医护人员。

您无需因感冒或其他轻微疾病推迟疫苗接种。但若有疑虑，请向医护人员咨询。

什么是丙型脑膜炎双球菌感染？

丙型脑膜炎双球菌感染是由称为丙型脑膜炎双球菌的细菌引起的。这种细菌能引起严重且危及生命的感染，例如脑膜炎（覆盖大脑的内膜感染）和败血症（血液感染）。即使接受治疗，每 100 名患者中也有多达 15 人会因此死亡。长期并发症包括大脑损伤、耳聋和截肢。

脑膜炎双球菌感染可经由咳嗽、打喷嚏或近距离面对面接触而在人际间传播，也可经由唾液传播。婴幼儿可能通过与其他儿童共用安抚奶嘴、奶瓶或玩具而患病。年长的儿童和成人则可能通过亲吻，或分享食物、饮料、香烟、口红、水瓶，以及运动用护齿或乐器吹口而患病。

得益于常规儿童免疫计划的执行，丙型脑膜炎双球菌感染现在在卑诗省已很少见。

成熟未成年人同意接种疫苗

我们建议家长或监护人与子女先讨论是否同意免疫接种。年龄未满 19 岁的儿童，如能了解接种疫苗的好处、每种疫苗的可能反应，以及不接种疫苗的风险，可以就同意或拒绝免疫接种作出合法决定。若要了解更多有关成熟未成年人同意接种疫苗的信息，请参阅 [HealthLinkBC File #119 未成年人法案、成熟未成年人同意书及免疫接种](#)。



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority