

B الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد Hepatitis B immune globulin

ما الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B؟

يؤمن الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B حماية فورية قصيرة الأجل ضد عدوى التهاب الكبد B. يحتوي الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B على كميات كبيرة من الأجسام المضادة المأخوذة من الدم البشري المتبرّع به. الأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجهاز المناعي للشخص لمحاربة الجراثيم، مثل البكتيريا والفيروسات مثل التهاب الكبد B.

الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B معتمد لدى وزارة الصحة الكندية.

هل الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B آمن؟

نعم. يُحضّر الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B من دم بشري متبرّع به بعد خضوعه لاختبارات للتأكد من سلامته. يُفحص جميع المتبرعين بالدم للتأكد من عدم تعرضهم للفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية و التهاب الكبد. يُفحص أيضًا جميع الدم المتبرّع به بالنسبة لوجود فيروسات منقولة بالدم قبل استخدامه في صنع الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B. تُتخذ عدة خطوات عند تحضير الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B من أجل تعطيل وإزالة الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تسبب المرض. يخضع التحضير النهائي للغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B لمزيد من الاختبارات للتأكد من عدم وجود فيروسات معدية معروفة. يوجد خطر ضئيل جدًا لنقل بعض أنواع العدوى المنقولة بالدم من خلال استخدام الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B. إلا أنه منذ بدء فحص الدم واختباره، لم يُبلغ عن أي عدوى منقولة بالدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C لدى الأشخاص الذين تلقوا الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B.

من يجب أن يتلقى الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B؟

يجب أن تتلقى جرعة واحدة من الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B إذا تعرضت لفيروس التهاب الكبد B ولا تُعتبر محصناً ضد الفيروس. يعمل الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B بالشكل الأمثل إن أُعطي في أسرع وقت ممكن، أي خلال 48 ساعة من التعرض للفيروس في الحالات المثلى. بناءً على نوع التعرض، قد يُعطى الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B خلال مدة تصل إلى 14 يوماً بعد التعرض.

يُنصح بأخذ الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B للفئات التالية:

- الأشخاص المعرضون المعروف أو المشكوك في إصابتهم بعدوى فيروس التهاب الكبد B عن طريق:

○ الوخز بإبرة محقنة مستعملة

○ التعرض لطرششة الدم المصاب بالعدوى في الفم، أو الأنف، أو العينين

○ التعرض للعض من قبل شخص مصاب بالتهاب الكبد B

○ التلامس مع أدوات منزلية، مثل فرشاة الأسنان أو خيط تنظيف الأسنان أو شفرة حلاقة ملوثة بدم شخص مصاب بالتهاب الكبد B

• من مارسوا الجنس غير المحمي مع شخص مصاب بالتهاب الكبد B

• الناجون من اعتداء جنسي

• حديثو الولادة والرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً، والمولودين لأمهات مصابات بالتهاب الكبد B

• الأطفال حديثو الولادة الذين تكون أمهاتهم معرضات لخطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد B، مثل أولئك اللاتي يحققن المخدرات أو يعملن في تجارة الجنس

اعتماداً على سجل تطعيمك، قد تتلقى جرعة من لقاح التهاب الكبد B عند حصولك على الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B. قد تحتاج لاحقاً إلى مزيد من جرعات لقاح التهاب الكبد B لتزويدك بوقاية طويلة الأمد ضد العدوى. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك. لمزيد من المعلومات، طالع [HealthLinkBC File #25a](#) لقاح التهاب الكبد B.

ما فوائد الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B؟

يؤمن الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B حماية فورية قصيرة الأجل ضد عدوى التهاب الكبد B. يُمكنه أن يمنع المرض أو أن يُخفف من شدته.

ما التفاعلات المحتملة بعد تلقي الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B؟

يُمكن أن تشمل التفاعلات الشائعة بعد تلقي الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B الألم في مكان إعطاء التطعيم. قد يحدث أيضاً صداع، أو حمى، أو غثيان، أو آلام في العضلات والمفاصل، أو تفاعلات تحسسية (الشرى والتورم).

يُمكن أن ترتبط بعض الغلوبولينات المناعية بخطر الإصابة بالخشار (جلطات الدم) في غضون 24 ساعة من تلقيها، خاصة عندما تُعطى كميات كبيرة. يزداد خطر الإصابة بالخشار لدى:

- من بلغ 45 سنة فما فوق
- من لديه سجل إصابة بالخثار سابقاً
- من لديهم عوامل خطر للخثار

يمكن إعطاء الأسيتامينوفين (مثل تايلينول®) أو الأيبوبروفين* (مثل أدفيل®) لتخفيف الحمى أو الألم. لا ينبغي إعطاء حمض الأسيتيل ساليسيليك ASA (كالأسبرين®) لمن هم دون سن الـ 18 لخطورة الإصابة بمتلازمة راي.

*لا ينبغي إعطاء آيبوبروفين للأطفال دون سن 6 أشهر قبل التحدث أولاً إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

لمزيد من المعلومات حول متلازمة راي، يرجى زيارة [HealthLinkBC](http://HealthLinkBC.ca) [File #84](http://HealthLinkBC.ca) - متلازمة راي.

من المهم البقاء في العيادة لمدة 15 دقيقة بعد تلقي أي لقاح. هناك احتمال ضعيف جداً لحصول رد فعل تحسسي مهدد للحياة يسمى التأق (فرط الحساسية). يحدث ذلك لأقل من 1 في المليون ممن يتلقون أي لقاح. قد تشمل الأعراض حدوث شرى (أرتيكاريا)، أو صعوبة في التنفس، أو تورم في الحنجرة أو اللسان أو الشفتين. إذا حدث هذا التفاعل، فإن مقدم الرعاية الصحية المتابع لك مستعد لعلاج. يتضمن العلاج الطارئ إعطاء الإبينفرين (الأدرينالين)، والنقل بسيارة الإسعاف إلى أقرب قسم للطوارئ. إذا ظهرت الأعراض بعد مغادرة العيادة، اتصل على الرقم 9-1-1 أو برقم قسم الطوارئ المحلي.

يجب أن تُبلغ مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بالتفاعلات الخطيرة أو غير المتوقعة دائماً.

من يجب أن لا يتلقى الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B؟

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إذا:

- تعرضت سابقاً إلى تفاعل مهدد للحياة من جرعة سابقة من أي غلوبولين مناعي أو أي من مكوناته.
- كنت تعاني من حالة تُسمى نقص الغلوبولين المناعي المعزول A
- إذا كان لديك سجل من الخثار أو عوامل خطر الخثار
- إذا كنت قد تلقيت لقاحاً ضد الحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية أو جدري الماء خلال الـ 14 يوماً الماضية
- لا حاجة لتأخير تلقي اللقاح بسبب الإصابة بالزكام أو أمراض بسيطة أخرى. ولكن إذا كانت لديك مخاوف تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

ما التهاب الكبد B؟

التهاب الكبد B هو فيروس يصيب بعدواه الكبد. يمكن أن يسبب مرضاً خطيراً يشمل تلفاً مستديماً في الكبد (تليف الكبد). التهاب الكبد B هو أيضاً أحد المسببات الرئيسية لسرطان الكبد والذي يمكن أن يكون مميتاً. ينتقل فيروس التهاب الكبد B من المصاب إلى الآخرين عن طريق الدم أو سوائل الجسم.

عادة ما يستغرق ظهور أعراض المرض ما بين 2 إلى 3 أشهر بعد دخول الفيروس إلى جسمك. قد تشمل أعراض التهاب الكبد B الوهن، والحمى، والغثيان والقيء، وفقدان الشهية، وألم في البطن، والبول الداكن اللون، والبراز الباهت اللون، واليرقان (اصفرار الجلد والعينين). لا تبدو الأعراض على كثير ممن يصابون بالتهاب الكبد B، وقد لا يعرفون أنهم مرضى. يمكنك نشر فيروس التهاب الكبد B إلى الآخرين حتى لو لم تظهر عليك أي أعراض.

موافقة القاصر الناضج

يُنصح بأن يناقش الأهالي أو أولياء الأمور أطفالهم حول الموافقة على التطعيم. الأطفال الذين لم يبلغوا 19 عاماً، والذين يمكنهم فهم فوائد كل لقاح والتفاعلات المحتملة له وخطورة عدم أخذه، يمكنهم قانونياً الموافقة على التطعيم أو رفضه. لمزيد من المعلومات حول موافقة القاصر الناضج، انظر [HealthLinkBC](http://HealthLinkBC.ca) [File #119](http://HealthLinkBC.ca) قانون الرضخ، وموافقة القاصر الناضج والتطعيم.



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority