

## حماية طفلك من التهاب الكبد الوبائي B عند الولادة Protecting your baby against hepatitis B at birth

• لقاح التهاب الكبد الوبائي B: يساعد الطفل على إنتاج الأجسام المضادة الخاصة به

إذا لم تكن الأم مصابة بالتهاب الكبد الوبائي B، ولكن أحد أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية مصاب به، سيتلقى الطفل لقاح التهاب الكبد الوبائي B عند الولادة فقط.

بعد الولادة، سيحصل الطفل على 3 جرعات إضافية من لقاح التهاب الكبد الوبائي B في عمر 2 و4 و6 أشهر. تُعطى هذه الجرعات مع اللقاحات الروتينية الأخرى للأطفال. لمزيد من المعلومات، طالع [ملف](#)

[HealthLinkBC رقم 105 لقاح الخناق \(الدفتيريا\) والكزاز \(التيتانوس\) والسعال الديكي والتهاب الكبد B وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع B \(DTaP-HB-IPV-Hib\).](#)

يحتاج الأطفال المتلقين للتطعيم عند الولادة إلى إجراء فحص دم بعد أربعة أسابيع من آخر جرعة من لقاح التهاب الكبد الوبائي B للتأكد من أنهم محميون.

قد يكون بعض الأطفال الذين تلقوا لقاح التهاب الكبد الوبائي B عند الولادة على جدول تطعيمات مختلف. في حال عدم تأكدك من الموعد الذي يجب فيه تطعيم طفلك أو خضوعه للاختبار، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك. من المهم الاحتفاظ بسجل لجميع التطعيمات التي يتلقاها طفلك.

لمزيد من المعلومات حول الجلوبيولين المناعي لالتهاب الكبد الوبائي B أو لقاح التهاب الكبد الوبائي B للأطفال، تفضل بزيارة [ملف HealthlinkBC رقم b25 الجلوبيولين المناعي لالتهاب الكبد الوبائي B](#) و [ملف HealthLinkBC رقم c25 لقاح التهاب الكبد الوبائي B للأطفال](#).

### ما فوائد لقاح التهاب الكبد الوبائي B؟

يعد لقاح التهاب الكبد الوبائي B أفضل طريقة لحماية طفلك من التهاب الكبد الوبائي B ومضاعفاته، بما في ذلك تلف الكبد الدائم وسرطان الكبد والوفاة.

عندما يتلقى طفلك التطعيمات، فإنك تُساعد بذلك في حماية الآخرين أيضًا.

### ما التفاعلات المحتملة بعد تلقّي اللقاح؟

اللقاح آمن جدًا. تلقي اللقاح هو أكثر أمانًا من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي B.

أبقى طفلك في أمان.  
احصل على جميع لقاحاتك في الوقت المحدد  
إن أخذ جميع اللقاحات في موعدها يقي طفلك من العديد من الأمراض طوال حياته.

خلال الخمسين عامًا الماضية، أنفذ التطعيم في كندا أرواحًا أكثر من أي إجراء آخر.

### ما هو لقاح التهاب الكبد الوبائي B؟

يقي لقاح التهاب الكبد الوبائي B من فيروس التهاب الكبد الوبائي B، يُقدّم مجانًا للأطفال كجزء من تطعيماتهم الروتينية. وهو مُعتمد من قبل وزارة الصحة في كندا.

### ما التهاب الكبد الوبائي B؟

التهاب الكبد الوبائي B هو فيروس يهاجم الكبد. عادة ما يبقى الفيروس في أجسام الرضع مدى الحياة عند إصابتهم به. مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا مشاكل صحية خطيرة مثل تلف الكبد الدائم (تليف الكبد). ويعتبر التهاب الكبد الوبائي B أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد، والذي يمكن أن يكون قاتلاً. ولهذا السبب من المهم الحصول على الحماية من اللقاح في سن مبكرة.

### من يجب أن يتلقى لقاح التهاب الكبد الوبائي B عند الولادة؟

يتلقى الأطفال لقاح التهاب الكبد الوبائي B عند الولادة إذا كانت أمهاتهم مصابات بالتهاب الكبد الوبائي B أو معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بالعدوى. يجب أيضًا أن يحصل الطفل على اللقاح عند الولادة إذا كان أحد أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية مصابًا بالتهاب الكبد الوبائي B. للحصول على قائمة بالأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي B، تفضل بزيارة [ملف HealthLinkBC رقم a25 لقاح التهاب الكبد الوبائي B](#).

### كيف تتم حماية الطفل من التهاب الكبد الوبائي B عند الولادة؟

إذا كانت الأم مصابة بالتهاب الكبد الوبائي B أو معرضة لخطر الإصابة به، سوف يتلقى طفلها جرعتين من التطعيم عند الولادة:

- الجلوبيولين المناعي لالتهاب الكبد الوبائي B: يمنح الطفل حماية فورية من خلال الأجسام المضادة ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي B

يُمكن أن تشمل التفاعلات الشائعة للقاح وجود ألم، واحمرار وانتفاخ في مكان تلقّي اللقاح. قد يعاني بعض الأطفال من الحمى أو الانزعاج أو التعب.

يجب عليك دائماً أن تُبلغ مقدم الرعاية الصحية المُتابع لك بالتفاعلات الخطيرة أو غير المتوقعة .

### كيف ينتشر التهاب الكبد الوبائي B؟

ينتشر التهاب الكبد الوبائي B من خلال ملامسة الدم المصاب وبعض سوائل الجسم - على سبيل المثال أثناء الولادة. يمكن أن ينتشر عن طريق مشاركة الأشياء التي قد تحتوي على دم مثل فرشاة الأسنان، وشفرات الحلاقة، وخط تنظيف الأسنان، ومبردات الأظافر، والإبر المستخدمة لحقن المخدرات. يمكن أن ينتشر أيضاً عن طريق ممارسة الجنس دون حماية مع شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي B.

الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي B هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ويجب عليهم تلقي لقاح التهاب الكبد الوبائي B. اللقاح مجاني لهؤلاء الأفراد. اتصل بمقدم الرعاية الصحية المُتابع لك لتحديد موعد. لمزيد من المعلومات حول لقاح التهاب الكبد الوبائي B، تفضل بزيارة [ملف HealthLinkBC رقم a25 لقاح التهاب الكبد الوبائي ب.](#)

### هل يمكنني إرضاع طفلي إذا كنت مصابة بالتهاب الكبد الوبائي B؟

نعم يمكنك الرضاعة الطبيعية. لا ينتشر التهاب الكبد الوبائي B عن طريق الرضاعة الطبيعية إلا إذا كانت حلمتك متشققة أو تنزف.

### لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات حول التطعيمات في بريتش كولومبيا، تفضل بزيارة [جداول التطعيمات الخاصة بـ HealthLink BC.](#)

يمكن إعطاء الأسيتامينوفين (مثل تايلينول®) أو الأيبوبروفين\* (مثل أدفيل®) لتخفيف الحمى أو الألم. لا ينبغي إعطاء حمض الأسيتيل ساليسيليك (كالأسبرين®) لمن هم دون سن الـ 18 لخطورة الإصابة بمتلازمة راي.

\*لا ينبغي إعطاء آيبوبروفين للأطفال دون سن 6 أشهر قبل التحدث أولاً إلى مقدم الرعاية الصحية المُتابع لك.

لمزيد من المعلومات حول متلازمة راي، يرجى زيارة [ملف HealthLinkBC رقم 84 - متلازمة راي.](#)

من المهم البقاء في العيادة لمدة 15 دقيقة بعد تلقي اللقاح. هناك احتمال ضعيف جداً لحصول رد فعل تحسسي مهدد للحياة يسمى التّاق (فرط الحساسية). ويحدث هذا لدى أقل من واحد من كل مليون شخص يحصلون على اللقاح. قد تشمل الأعراض حدوث شرى (أرتكاريا)، أو صعوبة في التنفس، أو تورّم في الحنجرة أو اللسان أو الشفتين. إذا حدث هذا التفاعل، فإن مقدم الرعاية الصحية المُتابع لك مستعد لعلاج. يتضمن العلاج الطارئ إعطاء الإبينفرين (الأدرينالين)، والنقل بسيارة الإسعاف إلى أقرب قسم للطوارئ. إذا ظهرت أعراض بعد مغادرة العيادة، اتصل على الرقم **9-1-1** أو برقم قسم الطوارئ المحلي.



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority