

為初生嬰兒預防乙型肝炎

Protecting your baby against hepatitis B at birth

保障您孩子的健康，
帶他們按時接種疫苗。

如能按時接種所有疫苗，您的孩子便能終身免受許多疾病的威脅。

過去五十年間，免疫接種在加拿大挽救的生命比任何醫療手段都要多。

甚麼是乙型肝炎疫苗？

乙肝疫苗能預防乙型肝炎病毒。卑詩省免費為嬰兒提供乙型肝炎疫苗，作為兒童常規免疫接種的一部分。這種疫苗已獲加拿大衛生部批准使用。

甚麼是乙型肝炎？

乙肝病毒是一種侵襲肝臟的病毒，如嬰兒受到感染，病毒通常會伴隨終生。隨著時間過去，病毒可導致嚴重的健康問題，例如永久性肝臟損傷（肝硬化）。乙肝也是肝癌這種可致命疾病的主要誘因。所以，在嬰幼兒時期接種疫苗預防乙肝十分重要。

哪些寶寶應該在出生時便須接種乙肝疫苗？

如果母親患有乙肝，或屬於感染乙肝的高風險群體，寶寶出生時會獲接種乙肝疫苗；如果家庭成員中有人感染了乙肝，或看護嬰兒的人士感染了乙肝，那麼寶寶也應在出生時接種乙肝疫苗。請參閱 [HealthLinkBC File #25a 乙型肝炎疫苗](#)，瞭解哪些人感染乙肝的風險較高。

如何預防初生嬰兒感染乙肝？

如果母親為乙肝帶原者或有感染風險，她的寶寶在出生時將獲接種 2 劑疫苗：

- 乙型肝炎免疫球蛋白：透過抗體給予寶寶即時免疫力，抵抗乙肝病毒
- 乙型肝炎疫苗：使寶寶的身體自行產生抗體

如果母親沒有感染，但有家庭成員或照顧嬰兒的人士感染了乙肝，那麼寶寶出生時只需接種乙肝疫苗。

出生後，寶寶需再接再種 3 劑乙肝疫苗，時間分別是在出生 2 個月、4 個月和 6 個月時，與其它兒童期疫苗一併接種。如需更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #105 白喉、破傷風、百日咳、乙肝、小兒麻痺和乙型流感嗜血桿菌 \(DTaP-HB-IPV-Hib\) 疫苗](#)。

出生時進行過免疫接種的寶寶需在接種最後一劑乙肝疫苗 4 星期後驗血以確保其正發揮作用。

部分出生時接種了乙肝疫苗的寶寶，日後的免疫接種日程安排可能會有所不同。如果您不清楚寶寶應在何時接種或驗血，請向醫護人員查詢。請務必保存好寶寶所有的免疫接種記錄。

如需瞭解有關乙型肝炎免疫球蛋白或嬰兒乙型肝炎疫苗的更多資訊，請參閱 [HealthlinkBC File #25b 乙型肝炎免疫球蛋白](#) 和 [HealthLinkBC File #25c 嬰兒乙型肝炎疫苗](#)。

接種乙型肝炎疫苗有哪些好處？

接種乙肝疫苗是保障孩子感染乙肝及其併發症的最佳途徑，這些併發症包括永久性肝臟損傷、肝癌甚至死亡。

您為孩子接種疫苗的時，也在保護其他人。

接種該疫苗後可能出現哪些反應？

該疫苗非常安全。接種該疫苗遠比感染乙型肝炎更為安全。

接種該疫苗後的常見反應可能出現注射部位疼痛、紅腫；部分兒童可能出現發熱、煩躁和乏力症狀。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 acetaminophen（例如泰諾 Tylenol®）或布洛芬 ibuprofen*（例如雅維 Advil®）。不應該給未滿 18 歲人士服用乙酰水楊酸 ASA（例如阿司匹林 Aspirin®），因為有造成雷伊氏綜合症（Reye Syndrome）的危險。

*在事先沒有與醫護人員討論的情況下，不應該給未滿 6 個月大兒童服用布洛芬。

有關雷伊氏綜合症的更多資訊，請瀏覽 [HealthLinkBC File#84 雷伊氏綜合症](#)。

進行任何免疫接種後，都必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在非常罕見的情況下可能會出現名為「全身過敏性反應」(anaphylaxis) 的可致命反應，這種情況在接種疫苗後的發生概率不到百萬分之一。症狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難，以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應，醫護人員可在現場及時救治。緊急救治包括注射腎上腺素，以及由救護車將您送往最近的醫院急症室。若您在離開診所後出現這些反應，請致電 **9-1-1** 或當地急救電話。

請謹記，如出現任何嚴重或未曾預料到的反應，請告知醫護人員。

乙肝如何傳播？

乙型肝炎由接觸受感染者的血液或某些體液而傳播，分娩便是一例。共用可能沾血的物品（例如牙刷、剃刀、牙線、指甲銼、用以注射毒品的針頭等），以及未採取保護措施便與乙肝病毒感染者發生性行為，也會導致乙肝傳播。

與乙肝患者同住的人士感染乙肝的風險較高，應接種乙肝疫苗。這些人士均可免費接種疫苗。請聯絡醫護人員，安排接種。如需瞭解有關乙肝的更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #25a 乙型肝炎疫苗](#)。

如果我患有乙肝，能否哺乳？

可以。除非乳頭有損傷或流血，乙肝不會因哺乳傳播。

更多資訊

若需瞭解更多資訊，請參閱 [HealthLink BC 之疫苗接種時間表](#)。



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

如需查找有關更多話題的 HealthLinkBC 文檔，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files 網頁，或造訪您當地的公共衛生單位。如需在卑詩省內索取非緊急健康資訊和建議，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca，或致電 **8-1-1**（免費電話）。失聰和聽障人士，請致電 **7-1-1**。若您需要，我們亦可提供 130 多種語言的翻譯服務。