

# Comment protéger votre bébé contre l'hépatite B dès la naissance

## Protecting Your Baby against Hepatitis B at Birth

### Protégez votre enfant

#### Faites-le vacciner à temps

S'il est vacciné à temps, votre enfant peut être protégé pour la vie contre de nombreuses maladies.

Au Canada, depuis 50 ans, l'immunisation a sauvé un plus grand nombre de vies que toute autre mesure sanitaire.

### Qu'est-ce que le vaccin contre l'hépatite B?

Le vaccin contre l'hépatite B protège contre le virus de l'hépatite B. Il est administré gratuitement aux bébés dans le cadre de leur programme de vaccination systématique. Il est approuvé par Santé Canada.

### Qu'est-ce que l'hépatite B?

L'hépatite B est causée par un virus qui s'attaque au foie. Lorsque les bébés sont infectés, le virus reste généralement dans leur corps toute leur vie. Il peut causer de graves problèmes de santé, dont des lésions permanentes au foie (cirrhose). L'hépatite B est également la principale cause du cancer du foie, qui peut être mortel. C'est pourquoi il est si important de protéger les enfants en les faisant vacciner lorsqu'ils sont jeunes.

### Qui devrait être vacciné contre l'hépatite B dès la naissance?

Si une mère est atteinte de l'hépatite B, ou court un risque élevé d'en être atteinte, son bébé doit recevoir le vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Un bébé doit également être vacciné à la naissance si un membre du foyer ou une personne qui s'occupe de lui ou elle est atteint d'hépatite B. Pour consulter la liste des personnes qui courent un

risque élevé de contracter une infection par le virus de l'hépatite B, voir la fiche [HealthLinkBC File n° 25a Le vaccin contre l'hépatite B](#).

### Comment un bébé est-il protégé contre l'hépatite B dès la naissance?

Lorsqu'une mère est atteinte de l'hépatite B ou qu'elle est exposée à un risque d'infection élevé, son bébé recevra 2 injections à la naissance.

- Immunoglobuline anti-hépatite B : protège immédiatement le bébé grâce à des anticorps contre le virus de l'hépatite B.
- Vaccin contre l'hépatite B : aide le bébé à produire ses propres anticorps.

Si la mère n'est pas atteinte d'hépatite B, mais qu'un membre du foyer ou une personne qui s'occupe de lui ou elle l'est, le bébé ne recevra le vaccin contre l'hépatite B qu'à la naissance.

Après la naissance, le bébé devra recevoir trois autres doses de vaccin contre l'hépatite B, à l'âge de 2, 4 et 6 mois. Ces doses du vaccin sont administrées aux enfants avec d'autres vaccins infantiles courants. Pour en savoir plus, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 105 Le vaccin \(DTCa-HB-VPI-Hib\) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et l'Haemophilus influenzae de type b](#).

Les bébés vaccinés à la naissance devront subir des analyses sanguines quatre semaines après leur dernière dose de vaccin contre l'hépatite B, pour s'assurer que le vaccin les protège.

Certains bébés vaccinés contre l'hépatite B à la naissance pourraient avoir un calendrier de vaccination différent. Si vous n'êtes pas certain(e) de savoir à quel moment votre bébé devrait être vacciné ou subir des analyses de sang, adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé. Il est important de conserver des preuves de tous les

vaccins que votre bébé a reçus.

Pour en savoir plus sur l'immunoglobuline de l'hépatite B ou le vaccin contre l'hépatite B pour bébés, voir les fiches [HealthlinkBC File n° 25b Immunoglobuline anti hépatite B](#) et [HealthLinkBC File n° 25c Le vaccin contre l'hépatite B pour bébés](#).

## Quels sont les avantages du vaccin contre l'hépatite B?

Ce vaccin est le meilleur moyen de protéger votre enfant contre l'hépatite B et ses complications, dont des lésions permanentes au foie qui peuvent causer un cancer du foie et la mort.

Le faire vacciner, c'est aussi protéger les autres.

## Quelles sont les réactions possibles?

Le vaccin est très sûr. Il vaut mieux se faire vacciner que d'attraper l'hépatite B.

Les réactions courantes au vaccin comprennent de la douleur, une rougeur et une enflure au point d'injection. Certains enfants peuvent être fiévreux, irritables ou fatigués.

De l'acétaminophène (p. ex. du Tylenol®) ou de l'ibuprofène\* (p. ex. de l'Advil®) peuvent être administrés pour traiter la fièvre ou l'irritation. Il ne faut pas donner d'AAS (p. ex. de l'aspirine) aux enfants de moins de 18 ans, en raison des risques de syndrome de Reye.

\*Ne donnez pas d'ibuprofène aux enfants de moins de 6 mois sans en discuter d'abord avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour en savoir plus sur le syndrome de Reye, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 84 Le syndrome de Reye](#).

Il faut rester à la clinique pendant 15 minutes après avoir reçu un vaccin. Dans des cas extrêmement rares, une réaction allergique potentiellement fatale nommée anaphylaxie se produit après la vaccination. On l'observe moins d'une fois sur un million. Les symptômes peuvent se présenter

sous forme d'urticaire, de difficultés respiratoires ou d'enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres, que votre médecin peut traiter. Le traitement d'urgence consiste en l'administration d'épinéphrine (adrénaline) et le transport par ambulance vers le service des urgences le plus proche. Si ces symptômes apparaissent après votre départ, composez le **9-1-1** ou votre numéro d'urgence local.

Signalez toujours à votre fournisseur de soins de santé toute réaction grave ou inattendue.

## Comment l'hépatite B se transmet-elle?

L'hépatite B se transmet par contact avec du sang ou avec certains liquides organiques infectés, durant l'accouchement, par exemple. Elle se transmet également lorsque l'on partage des articles sur lesquels il peut y avoir du sang, comme les brosses à dents, les rasoirs, la soie dentaire, les limes à ongles et les aiguilles de seringue utilisées pour l'injection de drogues. Le virus de l'hépatite B se transmet aussi lors de rapports sexuels non protégés avec une personne infectée par le virus de l'hépatite B.

Les gens qui vivent sous le même toit qu'une personne atteinte de l'hépatite B courent un risque plus élevé d'être infectés et devraient être vaccinés. Le vaccin est gratuit pour ces personnes.

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour prendre un rendez-vous. Pour en savoir plus sur le vaccin de l'hépatite B, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 25a Vaccin contre l'hépatite B](#)

## Puis-je allaiter mon bébé si je suis atteinte de l'hépatite B?

Oui, vous pouvez allaiter. La mère ne peut pas transmettre l'hépatite B à son bébé, à moins que ses mamelons ne soient crevassés ou saignants.

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les vaccins en C.-B., consultez [HealthLink BC's Immunization schedules \(Calendriers de vaccination de HealthLink BC\)](#).



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, consultez [www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files](http://www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files) ou votre bureau de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, consultez [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) ou composez le **8-1-1** (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le **7-1-1**. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.