

A형 간염 예방접종 Hepatitis A Vaccine

캐나다에서 예방접종은 지난 50년간 다른 어느 보건 시책보다 많은 생명을 구했습니다.

A형 간염 예방접종이란?

A형 간염 예방접종은 A형 간염 바이러스 감염을 예방해줍니다. 이 백신은 캐나다 보건부(Health Canada)가 승인한 것입니다.

접종 대상자는 누구인가?

A형 간염 예방접종은 생후 6개월 이상인 사람에게 투여되며, 통상적으로 6개월 이상의 간격을 두고 2회 투여됩니다.

A형 간염 예방접종은 생후 6개월 이상 18세 이하의 원주민 아동 및 청소년에게 무상으로 제공됩니다.

A형 간염 예방접종은 다음과 같은 감염 또는 중병 고위험자에게도 무상으로 제공됩니다:

- 혈우병 환자, 또는 혈액/혈액제제가 반복적으로 투여되는 사람
- 불법 약물을 주사하거나, 약물 비강흡입/흡연/주사 기기를 공동 사용하는 사람
- 다른 남성과 성관계를 갖는 남성
- HIV, B형 및 C형 간염, 또는 만성 간질환 환자
- 줄기세포 이식을 받은 사람
- 간 이식 수술을 받았거나 받을 예정인 경우
- 교도소 재소자
- 감염자와 밀접하게 접촉하는 사람
- A형 간염에 걸린 식품취급자가 만든 음식을 먹은 사람

HIV 보균자는 예방접종을 3회 맞아야 합니다. 2차 접종은 1차 접종일로부터 1개월 후, 3차 접종은 2차 접종일로부터 5개월 후에 맞습니다.

A형 간염에 노출되었을 가능성이 있을 경우, 감염을 예방하기 위해 노출 시점으로부터 14일 이내에 예방접종을 1회 맞아야 합니다. 이 예방접종은 무상으로 제공됩니다.

다음과 같이 A형 간염 바이러스와 접촉하거나 전염시킬 가능성이 있을 경우, 예방접종이 권장되지만 무상으로 제공되지는 않습니다:

- A형 간염이 흔한 국가(특히 시골 지역)에서 살거나, 일하거나, 여행할 계획인 사람
- A형 간염이 흔한 국가에서 온 이민자
- A형 간염이 흔한 지역에서 온 입양아의 가정 및 밀접 접촉자
- 식품 취급자
- 성관계 상대가 2명 이상인 사람
- 지속적인 A형 간염 감염 문제가 있는 발달 장애인 돌봄 시설의 입주자 및 근무자
- 영장류를 다루는 동물원 사육사, 수의사 및 연구원
- A형 간염 바이러스 연구 또는 A형 간염 백신생산 종사자

모든 예방접종 기록을 잘 보관하십시오.

A형 간염 예방접종은 어떤 효과가 있나?

이 예방접종은 A형 간염 감염에 대한 최선의 보호책입니다. 예방접종을 맞으면 다른 사람들도 보호하는 것입니다.

접종 후 어떤 반응이 나타날 수 있나?

모든 백신은 매우 안전합니다. A형 간염에 걸리는 것보다 예방접종을 맞는 것이 훨씬 안전합니다. 이 백신에 대한 일반적 반응은 접종 부위의 동통, 발적, 부어오름 등입니다. 두통, 피로, 발열, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수도 있습니다. 이런

반응은 모두 경미하며 일반적으로 1-2일 지속됩니다.

발열 또는 동통에는 아세트아미노펜(Tylenol® 등) 또는 이부프로펜(Advil® 등)을 쓸 수 있습니다. 18 세 미만 아동/청소년은 라이증후군 위험이 있으므로 ASA(Aspirin® 등)를 복용하면 안됩니다.

라이증후군에 관해 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #84 라이증후군](#)을 참고하십시오.

가능성이 극히 희박하지만 ‘아나필락시스’라는 생명을 위협하는 알레르기 반응이 나타날 수도 있으므로, 모든 예방접종은 맞은 후 15분간 진료소에 머물러 있어야 합니다. 이 알레르기 반응의 발생 확률은 1백만분의 1도 채 되지 않습니다. 이 반응에는 두드러기, 호흡곤란, 목구멍/혀/입술 부어오름 등이 포함될 수 있습니다. 이런 반응이 나타날 경우, 보건의료 서비스 제공자가 즉시 적절한 처치를 할 수 있습니다. 응급 처치에는 에피네프린(아드레날린) 투여와 가까운 응급실로의 구급차 수송이 포함됩니다. 진료소에서 나온 후에 이런 증상이 나타날 경우에는 9-1-1 또는 거주지 관내 응급실로 전화하십시오.

심각하거나 예기치 않은 반응은 반드시 보건의료 서비스 제공자에게 알리십시오.

A형 간염 예방접종을 맞지 말아야 할 사람은?

과거에 A형 간염 백신, 백신의 성분(네오마이신 등), 또는 라텍스에 대해 생명이 위협한 반응이 나타난 적이 있을 경우, 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

감기 또는 기타 경미한 병 때문에 예방접종을 미룰 필요는 없지만, 염려되면 보건의료 서비스 제공자와 상담하십시오.

A형 간염이란?

A형 간염은 간을 공격하는 바이러스입니다. 증상은 피로, 발열, 구역 및 구토, 식욕부진, 복통, 어두운 색 소변, 탈색된 대변, 황달(피부와 눈이 노래지는 증상) 등입니다. 증상이 전혀 나타나지 않는 사람(특히 소아)도 있습니다. A형 간염으로 인한 사망은 드뭅니다(감염자 200명 중 약 1명). 50세 이상자는 위험이 더 높습니다.

A형 간염은 어떻게 전염되나?

A형 간염 바이러스는 감염자의 대변에서 발견됩니다. 이 바이러스는 감염자와의 밀접한 접촉을 통해, 또는 오염된 물을 마시거나 하수에 오염된 패류를 날것 또는 덜 익힌 상태로 먹을 경우에 전염될 수 있습니다. A형 간염 감염자가 화장실 사용 후 손을 제대로 씻지 않고 식품을 만질 경우, 또는 손에서 입으로의 다른 접촉을 통해 다른 사람에게 바이러스를 옮길 수 있습니다. 또한, 성적 접촉, 또는 불법 약물에 쓰이는 도구(주사바늘, 파이프 등)의 공동 사용에 의해 전염될 수도 있습니다.

성숙한 미성년자의 동의

부모/후견인과 그 자녀는 예방접종 동의에 대해 상의하는 것이 바람직합니다. 19세 미만 미성년자일지라도 백신의 효과와 가능한 반응, 그리고 예방접종을 맞지 않을 경우의 위험을 이해할 수 있다면 합법적으로 예방접종에 동의하거나 거부할 수 있습니다. 성숙한 미성년자의 동의에 관해 자세히 알아보려면 [HealthLinkBC File #119 미성년자법\(The Infants Act\) - 성숙한 미성년자의 동의와 예방접종을](#) 참고하십시오.

더 자세히 알아보려면 웹사이트 <https://immunizebc.ca>를 방문하십시오.