



## 清除嚙齒動物（大老鼠和小老鼠） Getting rid of rodents (rats and mice)

雖然卑詩省內有二十多種嚙齒動物，但只有三種會常給家居或農場帶來問題。這三種嚙齒動物是：

- 家鼠
- 褐鼠（挪威鼠）
- 黑鼠（屋頂鼠）

### 嚙齒動物會造成甚麼損害？

老鼠和小鼠會咀嚼建築材料，包括絕緣材料、壁板、牆板及電線，導致嚴重的財產損失。牠們會啃吃各種各樣的食物，包括您可能存放在櫥櫃或食品櫃中的食物。如果您食用被嚙齒動物污染的食物，則可能會罹患食源性疾病。如果您被嚙齒動物咬傷，或者您接觸到被嚙齒動物尿液或糞便污染的区域，也可能會傳播疾病。

漢他病毒肺綜合症（Hantavirus Pulmonary Syndrome，簡稱 HPS）與吸入野生鹿鼠的乾糞便有關。尚未發現 HPS 與更常見的室內小鼠有關。如需瞭解更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #36 漢他病毒肺綜合症](#)。由嚙齒類動物身上攜帶的蟬蟲和跳蚤也會傳播疾病。如需瞭解有關蟬蟲叮咬的更多資訊，請參閱 [HealthLinkBC File #01 蟬蟲叮咬和疾病](#)。

### 嚙齒動物的踪跡容易發現嗎？

大鼠和小鼠很容易被發現，牠們會留下大量的踪跡。您可能會發現的踪跡括老鼠巢的材料、深棕色糞便、咀嚼材料或食用家用食物（包括穀物盒或櫃檯上的水果）留下的碎屑，或外面土壤中的洞穴等。當房子安靜下來時，您也有可能聽到嚙齒動物在牆壁之間、閣樓、地基底下之間移動，甚至咀嚼材料的聲音。

### 我如何才能清除嚙齒動物？

大鼠和小鼠繁殖快速，因此快速有效地找出並擺脫牠們非常重要。即使您沒有看到真正的嚙齒動物，糞便的大小和形狀也可以告訴您是大鼠還是小鼠。這一點很重要，因為不同的嚙齒動物有不同的控制方法。小鼠糞便長約 6 毫米（1/4 英吋），呈橢圓形。屋頂老鼠糞便長約 13 毫米（1/2 英吋）帶尖端；褐鼠糞便長約 19 毫米（3/4 英吋）帶鈍端。

捕捉大鼠或小鼠的最佳方式是使用捕鼠器。如果使用裝有彈簧的捕鼠器，請連續在其中三個裝上誘餌，而不要上彈簧。以水果乾、花生醬與燕麥或奶酪混合作誘餌。將捕鼠器設置在已知嚙齒動物行走路綫的牆壁的「直角」（90 度角），並將帶有誘餌的一面朝向牆壁。當嚙齒動物習慣餵食時，設置捕鼠器。請確保將誘餌固定在踏板上，以便在移除食物時彈出彈簧。

捕捉到嚙齒動物後，切勿徒手觸碰。戴上手套才處理死鼠及捕鼠器。根據當地附例，將死鼠雙重裝袋封好，然後埋起、燒掉或放入垃圾桶。如果戴上手套，則可重置捕鼠器。

超聲波驅鼠器雖在最初使用時很有效，但開銷昂貴，並且長期驅趕嚙齒動物的效果並不理想。

### 我可以使用毒藥來驅除嚙齒動物嗎？

使用毒藥或誘餌來控制嚙齒動物並非好主意。中毒的嚙齒動物會爬走並死亡，使其屍身很難找到，從而產生難聞的氣味。毒藥也可能會意外傷害寵物、野生動物甚至兒童。

如果在採取預防措施後，家中鼠患仍未解決，而您仍希望嘗試使用有毒滅鼠葯，那就應該考慮以下事項：

- 在設置誘餌的前幾天，先放置一些無毒的食物，讓嚙齒動物在該區域覓食。
- 仔細閱讀並遵守標籤上的使用說明。
- 請在兒童和寵物無法接觸到的區域設置誘餌。
- 立即清除已經死去的嚙齒動物，在清除有害蟲獸的工作結束後，清除所有誘餌。

如果您無法自行控制嚙齒動物，請聯絡擁有具備資歷的員工的持牌公司提供協助。

### 我如何才能防止嚙齒動物在住所出沒？

您可以採取措施，防止嚙齒動物在您的住所出沒。

#### 1. 清除食物和水源：

- 將所有垃圾裝在可以防止有害蟲獸的容器中，並將蓋子蓋緊。
- 遵守良好的堆肥收集做法以控制嚙齒動物。
  - 切勿把食物殘渣丟入後院堆肥，尤其是已煮熟的食物、肉類或骨頭。
  - 在堆肥中加入石灰。

- 攪拌堆肥。
- 使用可以防止有害蟲獸的堆肥容器。
- 撿走院子裡掉落的水果和堅果。
- 餵食後立即清除寵物食品，切勿將食物留在室外過夜。
- 清理寵物籠內的垃圾及食物。
- 給餵鳥裝置配備托盤，並經常清除散落的鳥糧。
- 修補水管的任何洩漏之處以切斷水源。
- 不使用泳池和按摩池時應蓋好。

## 2. 消除嚙齒動物藏身和生活的地方：

- 不要在建築周圍種植花木、堆放木材或垃圾。
- 修剪建築物附近的植物，使地面以上 15 至 20 公分（6 至 8 英吋）的地方清楚可見。修剪樹枝或灌木叢的枝幹，以切斷通往屋頂或陽台的通道。
- 清除不用的木材堆和舊儲物棚。
- 不要將舊車或舊家具存放在室外。
- 把木材和木柴存放在離地 30 至 45 厘米（12 至 18 英吋）的架子上。

## 3. 為建築加上防止有害蟲獸的保護：

- 用 6 毫米（1/4 英吋）的金屬篩網或鋼絲網覆蓋修理用爬行空間、通風口和排氣口。
- 密封建築物外部大於 6 毫米（1/4 英吋）的任何可能入口。密切留意門堵以及壁板與房屋地基之間間隙。如果您家中有屋頂老鼠，請別忘記檢查屋頂是否有破洞。
- 修補水泥地腳和地基的裂縫。
- 儲物棚應建造在混凝土板上。

## 我該如何清理嚙齒動物出沒過的區域？

當您清理老鼠曾居住過的區域時，請避免揚起灰塵。這包括為任何封閉區域通風 30 分鐘，並在開始清潔前用家用消毒劑噴濕該區域。大多數的通用消毒劑和家用洗滌劑都有功效。也可以使用一份漂白劑加十份水的混合清潔劑。將混合物小心倒上該區域，避免揚起任何存在的病毒——請勿使用噴霧器。

用廚房紙巾擦拭糞便、鼠巢材料及其它廢物，並裝入塑膠垃圾袋中。切勿掃地或吸塵。

用兩層垃圾袋包裹上述廢物，繫緊袋口，然後根據當地的附例填埋、焚燒或將垃圾袋置於垃圾桶中。

清潔地板、地毯、衣物及寢具，並消毒老鼠接觸過的檯面、櫥櫃及抽屜。

在除下橡膠手套前，先用消毒劑或肥皂和水清洗手套。取下手套後，請用肥皂和水洗手。

在清掃過程中，應確保佩戴貼臉且大小合適的過濾口罩、橡膠手套及護目鏡。如需瞭解有關合適口罩的更多資訊，請聯絡當地的公共衛生單位或環境衛生官員。

## 更多資訊

如需更多資訊，請瀏覽《卑詩省政府：嚙齒動物》網站：[www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/pesticides-pest-management/managing-pests/animals/rodents](http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/pesticides-pest-management/managing-pests/animals/rodents)，或聯絡您當地的環境衛生官員。

---

如需查找有關更多話題的 HealthLinkBC 文檔，請瀏覽 [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles) 網頁，或造訪您當地的公共衛生局。如需在卑詩省內獲取非緊急健康資訊和建議，請訪問 [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca)，或致電 8-1-1（免費電話）。失聰和弱聽人士如需協助，請致電 7-1-1。若您需要，我們亦可提供 130 多種語言的翻譯服務。